摛藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷三十三

詳校官主事臣陳木

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷三十三

刪補名醫方論卷八目録



小柴胡湯

大柴胡湯

柴胡桂枝湯

黄芩湯

黄連湯

黃連阿膠湯
理中湯丸
乾薑附子湯
茯苓四逆湯
附子湯
四逆湯
通脈四逆湯
白通湯

白通加豬膽汁湯

真武湯

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

吳茱萸湯

烏梅丸

赤石脂禹餘糧湯

白頭翁湯

卷三十三目錄

御纂醫宗金鑑卷三十三

刪補名醫方論卷八

小柴胡湯

治傷寒五六日寒熱往來胸脇苦滿嘿嘿不欲飲食心煩喜嘔口苦耳聾脈弦數者此是少陽經半表半裏之證宜此湯以和解之

柴胡 半觔

黃芩 三兩

人參三兩　半夏半升

甘草三兩炙　生薑三兩切

大棗十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

若胸中煩而不嘔去半夏人參加栝蔞實

若渴者去半夏加人參栝蔞根

若腹中痛去黄芩加芍藥

若脇下痞鞕去大棗加牡蠣

若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓

若不渴外有微熱者去人參加桂枝温覆取微似

汗愈

若嘔者去人參大棗生薑加五味子乾薑

集註程應旄曰方以小柴胡名者取配乎少陽之義也至於制方之旨及加減法則所云上焦得通津液得下胃氣因和盡之矣何則少陽經循脇肋在腹

陽背陰兩岐間在表之邪欲入裏為裏氣所拒故寒往而熱來表裏相拒而留於岐分故胸脇苦滿神識以拒而昏困故嘿嘿木受邪則妨土故不欲食膽為陽木而居清道為邪所鬱火無從泄逼炎心分故心煩清氣鬱而濁則成痰滯故喜嘔嘔則木火兩舒故喜之也此則少陽定有之證其餘或之云者以少陽在人身為遊部凡表裏經絡之罅皆能隨其虛而見之不定之邪也據證俱是太陽

經中所有者特以五六日上見故屬之少陽半表半裏兼而有之方是小柴胡證方中以柴胡疏木使半表之邪得從外宣黃芩清火使半裏之邪得從內徹半夏豁痰飲降裏氣之逆人參補久虛助生發之氣甘草佐柴芩調和內外薑棗佐參夏通達營衛相須相濟使邪無內向而外解也至若煩而不嘔者火成燥實而逼胸故去人參半夏加栝蔞實也渴者燥已耗液而逼肺故去半夏加栝蔞

根也腹中痛木氣散入土中胃陽受困故去黃芩以安土加白芍以戰木也脇下痞鞕者邪既留則木氣實故去大棗之甘而泥加牡蠣之鹹而耎也心下悸小便不利者水邪侵乎心矣故去黃芩之苦而伐加茯苓之淡而滲也不渴身有微熱者半表之寒尚滯於肌故去人參加桂枝以解之也欬者半表之寒湊入於肺故去參棗加五味子易生薑為乾薑以温之雖肺寒不減黃芩恐乾薑助熱

也總之邪在少陽是表寒裏熱兩鬱不得升之故小柴胡之治所謂升降浮沉則順之也

大柴胡湯

治熱結在內心下急嘔不止鬱鬱微煩柴胡證仍在者與大柴胡湯下之

柴胡半觔　黃芩三兩　芍藥三兩　半夏半升　枳實四枚　大黃二兩　生薑五兩　大棗十二枚擘

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服

一升日三服

註柴胡證在又復有裏故立少陽兩解法也以小柴胡湯加枳實芍藥者仍解其外以和其內也去參草者以裏不虛少加大黃以瀉結熱倍生薑者因嘔不止也斯方也柴胡得生薑之倍解半表之功捷枳芍得大黃之少攻半裏之效徐雖云下之亦下中之和劑也

柴胡桂枝湯

傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結此太陽少陽併病也柴胡桂枝湯主之

柴胡四兩　桂枝一兩半　人參一兩半　甘草一兩　半夏二合半洗　黃芩一兩半　芍藥一兩半　大棗六枚擘　生薑一兩半切

右九味以水七升煮取三升去滓分温服

集註 柯琴曰仲景書中最重柴桂二方以桂枝解太陽肌表又可以調諸經之肌表小柴胡解少陽半表亦可以和三陽之半表故於六經病外獨有桂枝證柴胡證之稱見二方之任重不拘於經也如陽浮陰弱條是仲景自為桂枝證之註釋血弱氣虛條亦仲景自為柴胡證之註釋桂枝有壞病柴胡亦有壞病桂枝有疑似證柴胡亦有疑似證病如

桂枝證而實非若脚攣急與胸中痞鞕者是已病如柴胡證而實非本渴而飲水嘔食穀嘔與但欲嘔胸中痛微溏者是已此條為傷寒六七日正寒熱當退之時反見發熱惡寒諸表證更見心下支結諸裏證表裏不解法當表裏雙解之然惡寒微發熱亦微可知肢節煩疼則一身骨節不疼可知微嘔心下亦微結故謂之支結表證雖不去而已輕裏證雖已見而未甚故取桂枝之半以散太陽

未盡之邪取柴胡之半以解少陽微結之證口不渴身有微熱者法當去人參以六七日來邪雖未解而正已虛故仍用之外證雖在而病機已見於裏故方以柴胡冠桂枝之上為雙解兩陽之輕劑也

黃芩湯

治太陽少陽合病自下利者若嘔者加半夏生薑

黃芩　甘草

芍藥各三兩　大棗十二枚擘

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再服夜一服

嘔者加半夏半升生薑三兩

集註程應旄曰此之合病者頭痛胸滿口苦咽乾目眩

或往來寒熱或鉄脈大而弦半表之邪不待太陽傳遞而即合少陽裏氣失守所以下利陽熱漸盛所以上嘔故用黄芩湯清熱益陰半裏清而半表自解矣

柯琴曰太陽少陽合病是熱邪已入少陽之裏膽火下攻於脾故自下利上逆於胃故兼嘔也與黄芩湯酸苦相濟調中以存陰也熱不在半表故不用柴胡令熱已入半裏故黄芩主之雖非胃實亦

非胃虛故不須人參以補中兼嘔者故仍加半夏生薑以降逆也

黃連湯

治傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者

黃連三兩　乾薑三兩

甘草三兩　人參二兩

桂枝三兩　半夏半升

大棗十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服一升日三服夜二服

集註程應旄曰熱在胸中有煩躁鬱悶之證可知胃中反有邪氣以寒邪被格在下故也此證寒熱俱有較之大青龍之寒熱已向近裏一層故其證不見之表裏際而祇見之上下際腹中痛者陰邪在胃而寒乃獨治於下也欲嘔吐者陽邪在胸而熱乃獨治於上也此為上下相格治法亦寒熱並施而辛寒易以苦寒辛熱加以苦熱更以人參半夏以補宣中氣升降陰陽自此條而互及瀉心諸湯皆

其法也

成無己曰濕家下後舌上如胎者以丹田有熱胸中有寒是邪氣入裏而為下熱上寒也此傷寒傳裏而為下寒上熱也

喻昌曰陰陽悖逆皆當和解法

黃連阿膠湯

治少陰病得之二三日以上心中煩不得卧

黃連四兩　黃芩一兩

芍藥二兩　雞子黃二枚

阿膠三兩

右五味以水五升先煮三物取二升去滓内膠烊盡小冷内雞子黃攪令相得温服七合日三服

集註柯琴曰此少陰病之瀉心湯也凡瀉心必藉連芩

而導引有陰陽之別病在三陽胃中不和而心下痞鞕者虛則加參甘補之實則加大黃下之病在少陰而心中煩不得臥者既不得用參甘以助陽亦不得用大黃以傷胃矣用芩連以直折心火用阿膠以補腎陰雞子黃佐芩連於瀉心中補心血芍藥佐阿膠於補陰中斂陰氣斯則心腎交合水升火降是以扶陰瀉陽之方變而為滋陰和陽之劑也是則少陰之火各歸其部心中之煩不得臥

可除矣經曰陰平陽秘精神乃治斯方之謂歟

理中湯九

治中氣不運腹中不實口失滋味病久不食藏府不調與傷寒直中太陰自利不渴寒多而嘔等證

人參三兩　白朮三兩

甘草三兩　乾薑三兩

右四味搗篩為末蜜丸如雞子黃大以沸湯數合和一丸研碎溫服之日三四枚夜二枚腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四物依兩數切用

水八升煮取三升去滓温服一升日三服

若臍上築者腎氣動也去术加桂四兩

多吐者去术加生薑三兩

下多者還用术

悸者加茯苓二兩

渴欲得水者加术足前成四兩半

腹中痛者加人參足前成四兩半

寒者加乾薑足前成四兩半

腹滿者去术加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一升許微自温勿發衣被

集註程應旄曰陽之動始於温温氣得而穀精運穀氣升而中氣贍故名曰理中實以燮理之功予中焦之陽也若胃陽虛則中氣失宰膻中無發宣之用六府無灑陳之功猶如釜薪失焰故下致清穀上失滋味五藏凌奪諸證所由來也參术炙草所以守中州乾薑辛以温中必假之以焰釜薪而騰陽

氣是以穀入於陰長氣於陽上輸華蓋下攝州都五藏六府皆以受氣此理中之旨也若水寒互勝即當脾腎雙温加以附子則命門益土母温矣白术補脾得人參則壅氣故臍下動氣吐多腹滿者去术也加桂以伐腎邪加生薑以止嘔也加附子以消陰也下多者濕勝也還用术燥濕也渴欲飲水飲渴也加术使飲化津生也心下悸停水也加茯苓導水也腹中痛倍人參虛痛也寒者加乾薑

寒甚也

乾薑附子湯

下後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者乾薑附子湯主之

乾薑一兩　附子一枚去皮生用破八片

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

茯苓四逆湯

傷寒厥而心下悸發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之

茯苓六兩　人參一兩

甘草一兩炙　乾薑一兩

附子一枚生用破八片

右五味以水五升煮取三升去滓溫服七合日三服

註凡太陽病治不如法汗後復下或下後復汗誤而又誤變成壞病若其人陽盛而從熱化則轉屬三陽陽衰而從寒化則繫在三陰此二湯所治之頃

躁皆壞病也煩躁雖六經俱有而多見於太陽少陰者太陽為真陰之標少陰為真陽之本也未經汗下而煩躁多屬陽其脈實大其證渴熱是煩為陽盛躁為陰虛已經汗下而煩躁多屬陰其脈沉微其證汗厥是煩為陽虛躁為陰極也夫先下後汗於法為逆外無大熱內不渴嘔似乎陰陽自和而實妄汗亡陽所以虛陽擾亂於陽分故晝日煩躁不得眠盛陰偏安於陰分故夜而安靜脈沉微

是真陽將脫而煩躁也用乾薑附子壯陽以配陰薑附者陽中陽也生用則力更銳不加甘草則勢更猛是方比四逆為峻救其相離故當急也先汗後下於法雖順若病不解厥悸仍然驟增晝夜煩躁似乎陰盛格陽而實腎上凌心皆因水不安其位挾陰邪而上乘是陽虛有水氣之煩躁也用茯苓君四逆抑陰以伐水人參佐四逆生氣而益陽參苓君子也兼調以甘草比四逆為緩陰陽不急

故當緩也一去甘草一加參苓而緩急自別仲景用方之妙如此

附子湯

治少陰病身痛手足寒骨節痛口中和背惡寒脈沉者

附子二枚生用去皮破八片　茯苓三兩

人參二兩　白朮四兩

芍藥三兩

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

註少陰為寒水之藏故傷寒之重者多入少陰所以少陰一經最多死證方中君附子二枚者取其力之鋭且以重其任也生用者一以壯少火之陽一以散中外之寒則惡寒自止身痛自除手足自温矣所以固生氣之原令五藏六府有本十二經絡有根絡自不沉骨節可和矣更佐白朮以培土芍藥以平木茯苓以伐水水伐火自旺旺則陰翳消木平土益安安則水有制制則生化此萬全之術

其畏而不敢用束手待斃者曷可勝計耶

四逆湯

治厥沉厥逆等證

甘草二兩炙　乾薑一兩半　附子一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服强人可大附子一枚乾薑三兩

註方名四逆者主治少陰中外皆寒四肢厥逆也君以炙草之甘温温養陽氣臣以薑附之辛温助陽

勝寒甘草得薑附鼓腎陽温中寒有水中煖土之功薑附得甘草通關節走四肢有逐陰回陽之力腎陽鼓寒陰消則陽氣外達而厥升手足温矣

通脈四逆湯

治少陰下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絶身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者厥陰下利清穀裏寒外熱汗出而厥者主之

乾薑三兩强人可四兩　甘草二兩炙　附子大者一枚生用去皮

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服

其衄即出者愈

面色赤者加葱九莖

腹中痛者去葱加芍藥二兩

嘔者加生薑二兩

咽痛去芍藥加桔梗一兩

利止衄不出者加人參二兩

註論中扶陽抑陰之劑中寒陽微不能外達主以四逆中外俱寒陽氣虛甚主以附子陰盛於下格陽

於上主以白通陰盛於內格陽於外主以通脈是則可知四逆運行陽氣者也附子温補陽氣者也白通宣通上下之陽氣者也通脈通達內外之陽氣者也今脈微欲絶裏寒外熱是腎中陰盛格陽於外故主之也倍乾薑加甘草佐附子易名通脈四逆湯者以其能大壯元陽主持中外共拍外熱反之於內蓋此時生氣已離亡在俄頃若以柔緩之甘草為君豈能疾呼外陽耶故易以乾薑然必

加甘草與乾薑等分者恐渙漫之餘薑附之猛不能安養元氣所謂有制之師也若面赤者加葱以通格上之陽腹痛者加芍藥以和在裏之陰嘔逆者加生薑以止嘔咽痛者加桔梗以利咽利止脈不出氣少者俱倍人參以生元氣而復脈也

白通湯

治少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者白通加豬膽汁湯主之服湯脈暴出者死脈微續者生

葱白 四莖

乾薑 一兩

附子 一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升去滓分温再服

白通加豬膽汁湯

葱白四莖　乾薑一兩

附子一枚生用去皮破八片　人尿五合

豬膽汁一合

已上三味以水三升煮取一升去滓內豬膽汁人尿和令相得分溫再服若無膽汁亦可

註是方也即四逆湯減甘草加葱白也而名之曰白通者以葱白能通陽氣也減甘草者因其緩也加尿膽者從其類也下咽之後冷體既消熱性便發

情且不違而致大益則二氣之拒格可調上下之陰陽可通矣

真武湯

治少陰水氣為患腹痛下利四肢沉重疼痛小便不利其人或咳或嘔或小便利而下利者用此加減

白朮二兩　茯苓二兩

白芍二兩　大附子一枚炮

生薑三兩切

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服

若咳者加五味子半升細辛乾薑各一兩

若小便利者去茯苓

若下利去芍藥加乾薑二兩

若嘔去附子加生薑足成半斛

註小青龍湯治表不解有水氣中外皆寒實之病也真武湯治表已解有水氣中外皆寒虛之病也真武者北方司水之神也以之名湯者藉以鎮水之義也夫人一身制水者脾也主水者腎也腎為胃

關聚水而從其類倘腎中無陽則脾之樞機雖運而腎之關門不開水即欲行以無主制故泛溢妄行而有是證也用附子之辛熱壯腎之元陽則水有所主矣白朮之苦燥建立中土則水有所制矣生薑之辛散佐附子以補陽於主水中寓散水之意茯苓之淡滲佐白朮以健土於制水中寓利水之道焉而尤妙在芍藥之酸收仲景之旨微矣蓋人之身陽根於陰若徒以辛熱補陽不少佐以酸

收之品恐真陽飛越矣用芍藥者是亟收陽氣歸根於陰也於此推之則可知誤服青龍致發汗亡陽者所以於補陽藥中之必需芍藥也然下利減芍藥者以其陽不外散也加乾薑者以其温中勝寒也水寒傷肺則咳加細辛乾薑者散水寒也加五味子者收肺氣也小便利者去茯苓以其雖寒而水不能停也嘔者去附子倍生薑以其病非下焦水停於胃也所以不須温腎以行水祇當温胃

以散水且生薑功能止嘔也

當歸四逆湯

手足厥冷脈細欲絕者主之若其人內有久寒加吳茱萸生薑

當歸三兩　桂枝三兩

芍藥三兩　細辛二兩

通草二兩　甘草二兩炙

大棗二十五枚擘

右七味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三

服

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

於前湯內加吳茱萸半觔生薑三兩

右九味以水六升清酒六升和煮取五升去滓分

温五服

註凡厥陰病則脈微而厥以厥陰為三陰之盡陰盡

陽生若受其邪則陰陽之氣不相順接故脈微而

厥也然厥陰之藏相火遊行其間經雖受寒而藏

不即寒故先厥者後必發熱所以傷寒初起見其手足厥冷脈細欲絶者不得遽認為虛寒而用薑附也此方取桂枝湯君以當歸者厥陰主肝為血室也佐細辛味極辛能達三陰外温經而内温藏通草其性極通善開關節内通竅而外通營倍加大棗即建中加飴用甘之法減去生薑恐辛過甚而迅散也肝之志苦急肝之神欲散甘辛並舉則志遂而神悦未有厥陰神志遂悦而脈微不出手

足不溫者也不須參苓之補不用薑附之峻此厥陰厥逆與太少不同治也若其人內有久寒非辛溫之品所能兼治則加吳茱萸生薑之辛熱更用酒煎佐細辛直通厥陰之藏迅散內外之寒是又救厥陰內外兩傷於寒之法也

吳茱萸湯

治厥陰病乾嘔吐涎沫頭痛者少陰證吐利手足厥冷煩躁欲死者陽明食穀欲嘔者

吳茱萸一升　人參三兩　生薑六兩　大棗十二枚擘

右四味以水七升煮取二升溫服七合日三服

集註羅謙輔曰仲景救陽諸法於少陰四逆湯必用薑附通脈四逆湯倍加乾薑其附子生用附子湯又

加生附至二枚所以然者或壯微陽使之外達或招飛陽使之內返此皆少陰真陽失所故以回陽為亟也至其治厥陰則易以吳茱萸而併去前湯諸藥獨用人參薑棗者蓋人身厥陰肝木雖為兩陰交盡而一陽之真氣實起其中此之生氣一虛則三陰濁氣直逼中上不惟本經諸證悉具將陽明之健運失職以至少陰之真陽浮露而吐利厥逆煩躁欲死食穀欲嘔種種叢生矣吳茱萸得東

方震氣辛苦大熱能達木鬱直入厥陰降其盛陰之濁氣使陰翳全消用以為君人參秉冲和之氣甘溫大補能接天真挽回性命升其垂絶之生氣令陽光普照用以為臣佐薑棗和胃而行四末斯則震坤合德木土不害一陽之妙用成而三焦之間無非生生之氣矣諸證有不退者乎蓋仲景之法於少陰則重固元陽於厥陰則重護生氣學者當深思而得之矣

烏梅丸

治厥陰病消渴氣上撞心心中疼熱饑而不欲食食即吐蚘又主久痢

烏梅三百箇　細辛六兩

乾薑十兩　黃連一斤

當歸四兩　附子六兩

蜀椒四兩去汗　桂枝六兩

人參六兩　黃蘗六兩

右十味異搗篩合治之以苦酒浸烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟搗成泥和藥令相得內臼中與蜜杵二千下丸如梧桐子大先食飲服十九日三稍加至二十丸禁生冷滑物臭食等

集註 柯琴曰六陰惟厥陰為難治其本陰其標熱其體木其用火必伏其所主而先其所因或收或散或逆或從隨所利而行之調其中氣使之和平是治厥陰法也厥陰當兩陰交盡又名陰之絕陽宜無

熱矣第其具合晦朔之理陰之初盡即陽之初生所以厥陰病熱是少陽使然也火王則水虧故消渴氣上撞心心中疼熱氣有餘便是火也木勝則尅土故饑不欲食蟲為風化饑則胃中空虛蚘聞食臭出故吐蚘也仲景立方皆以甘辛苦味為君不用酸收之品而此用之者以厥陰主肝木耳洪範曰木曰曲直作酸內經曰木生酸酸入肝君烏梅之大酸是伏其所主也配黃連瀉心而除疼佐

黃檗滋腎以除渴先其所因也連檗治厥陰陽邪則有餘不足以治陰邪也椒附辛薑大辛之品並舉不但治厥陰陰邪且肝欲散以辛散之也又加桂枝當歸是肝藏血求其所屬也寒熱雜用則氣味不和佐以人參調其中氣以苦酒浸烏梅同氣相求蒸之米下資其穀氣加蜜為丸少與而漸加之緩則治其本也蚘昆蟲也生冷之物與濕熱之氣相成故藥亦寒熱互用且胸中煩而吐蚘則連

藥是寒因熱用也蚘得酸則靜得辛則伏得苦則下信為治蟲佳劑久痢則虛調其寒熱酸以收之下痢自止

赤石脂禹餘糧湯

治久利不止大腸虛脫服理中丸而利益甚者

赤石脂一觔搗碎　禹餘糧一觔搗碎

右二味以水六升煮取二升去滓分温三服

集註柯琴曰甘薑參朮可以補中宮元氣之虛而不足以固下焦脂膏之脫此利在下焦故不得以理中之劑收功矣然大腸之不固仍責在胃關門之不閉仍責在脾二石皆土之精氣所結實胃而濇腸

急以治下焦之標者實以培中宮之本也要知此證土虛而火不虛故不宜於薑附若濕甚而虛不甚復利不止者故又當利小便也

白頭翁湯

治厥陰熱利下重鮀沉弦渴欲飲水者

白頭翁三兩　黃連三兩

黃檗三兩　秦皮三兩

右四味以水七升煮取三升去滓溫服一升不愈更服一升

註三陰俱有下利證自利不渴者屬太陰也自利而渴者屬少陰也惟厥陰下利屬於寒者厥而不渴

下利清穀屬於熱者消渴下重下利膿血此熱利下重乃火鬱濕蒸穢氣奔迫廣腸魄門重滯而難出內經云暴注下迫者是矣君以白頭翁寒而苦辛臣以秦皮寒而苦澁寒能勝熱苦能燥濕辛以散火之鬱澁以收下重之利也佐黃連清上焦之火則渴可止使黃蘗瀉下焦之熱則利自除也治厥陰熱利有二初利用此方以苦燥之以辛散之以澁固之是謂以寒治熱之法久利則用烏梅丸

之酸以收火佐以苦寒雜以温補是謂逆之從之隨所利而行之調其氣使之平也

御纂醫宗金鑑卷三十三



總校官庶吉士臣張能照
校對官庶吉士臣翟槐
謄録貢生臣王嘉稷