胤産全書

金壇王肯堂宇泰父纂著
海陽張受孔心如父參定
海陽姚學顏伯愚父校閱

痙瘛類

痙者筋脉拘急也瘛者筋脉張瘛也經云肝主筋而藏血蓋肝氣爲陽爲火肝血爲陰爲水此症因產血過多陽火燔盛筋無所養而然耳

至聖防風湯　治風虛發熱項背拘急肢節不隨恍

惚狂言來去無時不自覺悟亦治腑氣緩弱甚効

此藥温和不虛人

秦艽 獨活 麻黄去節 半夏湯泡七次切片
防風 各二兩 升麻 防已 白朮 石膏煅
白芍藥 黄芩 甘草 當歸 遠志
人參 各一兩

右爲粗末入生姜片令勻每服四錢水二盞生姜七八片煎至一盞去滓取清汁六分入麝香末少許食後臨卧帶熱服

海藏愈風湯　即華陀愈風湯　治前症

增損柴胡湯　治產後感異証手足搐搦潮畏悶

柴胡三錢　黃芩一錢二分　人參　甘草炙　半夏各一錢半　知母一錢　石膏二錢　黃芪二錢半

右㕮咀分二服水二盞姜三片棗二枚煎八分服

秦艽湯　前症已去次服此藥去其風邪

秦艽　芍藥　柴胡各一錢七分　炙甘草一錢二分　黃芩　防風各一錢二分　人參　半夏各一錢

右㕮咀分二服每服水二盞姜三片煎八分食遠

服

拘攣類

產後中風筋脉四肢攣急是氣血不足臟腑俱虛勞役虛損正氣未復爲風所乘風邪冷氣客於皮膚經絡令人頑痺不仁風氣入於筋脉挾寒則攣急也

芎藭湯 治產後中風四肢筋脉攣急疼痛背項強

芎藭 羌活 當歸 酸棗仁炒 羚羊角屑

各十錢半　防風　牛旁子各一兩炒　桂心

赤芍藥各半兩

右㕮咀每服八錢水一大盞半煎至一大盞去滓

溫服

防巳膏　治產後中風四肢筋脉攣急身體麻痺並

宜用之

漢防巳去皮半斤　茵芋五兩

右㕮咀用酒五升浸藥一宿取猪肪脂一斤文武

火熬三上三下成膏攤在紙花上貼病人患處以

熱手不住摩膏上

不語類

人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語

七珍散

人參 石菖蒲 生地黃 川芎各一兩

細辛一錢 防風 辰砂另研各半兩

右爲極細末每服一錢薄荷湯調下無時

孤鳳散　治產後閉目不語

用生白礬末每服一錢熟水調下

參蓮飲　治產後不語

人參　石蓮肉不去心　石菖蒲各等分

右每服五錢水煎

逐血補心湯　治產後失音不語

紅花　赤芍藥　生地黃　桔梗　蘇葉

前胡　茯苓　防風　牛膽南星　黃連

粉葛各二錢　當歸三錢　薄荷　人參

升麻各一錢半　半夏二錢五分　甘草一錢

右剉爲散分作二服每服水一鍾半姜三片煎至七分空心服渣再煎

狂言譫語顛狂乍見鬼神類

夫產後語言顛倒狂言譫語如見鬼神產後因驚敗血衝心昏悶發狂或因產傷血脉心氣既虛敗血停積上干於心心中煩躁言語顛錯臥起不安乍見鬼神

荷葉散　產後敗血衝心發熱狂言奔走脉虛大者

乾荷葉　生地黃　牡丹皮等分

三味濃煎湯調生蒲黃末二錢匕一服卽定

烏金散　治產後三五日或半月之間忽狂言亂語目見鬼神等證

當歸　遠志肉　川芎　酸棗仁　白朮　赤芍　香附　辰砂另研入　熟地　羌活　防風各二錢　茯神二錢　半夏二錢　全蝎　麥門冬　人參　牛膝　天麻各一錢　丹蔘九分　陳皮　白芷各一錢半

右劑散作二服水一鍾生薑三片葱三枝入金銀同煎一碗温服

四物補心湯　治產後言語恍惚顛倒錯亂

當歸五錢　川芎　生地黃　白芍藥　茯神　半夏　桔梗　白朮各四錢　陳皮三錢　甘草一錢

右劑爲散分作六服每服用水一鍾薑三片煎至柒分空心温服　有熱加酒炒黃連二錢無熱不用

茯神散　治產後血邪心神恍惚言語失度睡臥不

安

茯神一兩去皮木　人參　龍齒研　琥珀研

赤芍藥　黃芪　牛膝各七錢半　生地黃一兩半

柱心半兩

右爲末每服三錢水一盞煎七分去滓溫服

栢子仁散　治產後狂言亂語皆因內虛敗血挾邪氣攻心

栢子仁　遠志去心　人參　桑寄生　防風

琥珀另研　當歸焙　生地黃焙　甘草各等分

右爲粗末先用白羊心一個切片以水一大盞半先煮至九分去羊心入藥末五錢煎六分去滓服

驚悸恍惚類

產後臟虛心神驚悸由體虛心氣不足心之經爲風邪所乘或恐懼迫亦令心氣受於心邪若驚不已則悸動不定其狀目睛不轉而不能動診其脉動則爲驚弱則爲悸令人心神恍惚不定也

白茯苓散　治產後心神驚悸言語失常心神昏憒

白茯苓　熟地黃　人參各一兩　遠志去心

白芍藥　黃芪　桂心　當歸炒　甘草炙

麥門冬各一兩　石菖蒲　桑寄生各七錢半

右爲㕮咀每服八錢水一大盞半生姜五片棗三枚竹葉三七片煎至一大盞去渣溫服

產乳七寶散　初產後服之調和血氣補虛安心神鎮驚悸

硃砂水飛　桂心　當歸　川芎　人參

白茯苓　羚羊角燒存性各二錢　乾姜一錢

爲細末每服一錢用羌活豆淋酒調下不飲酒清

米飲調下

琥珀辰砂散　治血虛多驚及產後敗血諸疾

辰砂　琥珀　沒藥並細研　當歸各等分

右爲細末每服二錢空心白湯調下日三服

千金方　療產後暴苦心悸不定言語錯亂恍惚皆因心虛所致

茯苓三兩　芍藥二兩　甘草　桂心　當歸各一兩

生姜一兩半　麥門冬去心一升　大棗三十枚

右爲散水三升煎取一升去滓分作兩服

天麻丸　療產後中風恍惚語澁四肢不隨

天麻　珠砂水飛　防風　羌活各一兩　僵蠶炒七錢半　乾蝎炒　白附子炮　五靈脂炒各半兩　雄雀糞炒　牛黃另研各二錢半

右爲細末糯米飯爲丸如梧子大每服二三十丸薄荷酒送下日進三服

發熱煩渴類

產後虛煩發熱乃陽隨陰散氣血俱虛若惡寒發熱煩躁作渴急用十全大補湯若熱愈甚急加桂

附若作渴面赤宜用當歸補血湯若誤認爲火症
投以涼劑禍在反掌

三之一湯　治産後虛勞發熱日久不安

柴胡　黄芩　人參　半夏　川芎　當歸
芍藥　熟地　甘草　各一錢半

作一貼水二鍾姜三片紅棗一枚煎一鍾服

三分散　治産後日久虛勞發熱

川芎　當歸　芍藥　熟地黄　白朮
白茯苓　黄芪各一錢　柴胡　人參　半夏

甘草各半錢

右作一服水二鍾生姜三片紅棗一枚煎至一鍾

食前服

加味逍遥散　治産後發熱口乾作渴唇裂生瘡

當歸　白芍藥　乾葛各二錢　生地黄

川芎　黄芩各一錢半　人參九分　麥門冬九分

柴胡一錢　烏梅二個　甘草六分

右剉散分作二服用水一鍾煎七分空心服

一産後發熱多屬虚寒惟乾姜加入補藥中神効

此丹溪法也

沒藥丸　治產後心胸煩躁惡血不快

沒藥研　蠻姜　延胡索　乾漆炒　當歸
桂心　牛膝　牡丹皮　乾姜各等分

右爲細末醋煮面糊丸如梧桐子大煎麯湯下十九至十五丸

竹葉湯　治產後煩氣欲絕心中煩悶

竹葉切細　麥門冬　小麥各一升　甘草一兩
生姜二兩　大棗十二枚

右切以水一斗煮竹葉小麥至八升去滓納余藥

煮取三升去滓溫服虛悸加人參二兩少氣加糯

米五合

甘竹茹湯　治產後內虛煩熱短氣

甘竹茹一升　人參　茯苓　甘草各一兩

黃芩三兩

右㕮咀以水六升煮取二升去滓分三服日三

人參當歸湯　治產後去血過多血虛則陰虛陰虛

主內熱令人心悶短氣自汗頭痛

熟地黃 人參 當歸身 肉桂 麥門冬去心 各二錢 白芍藥炒二錢半 血熱甚者加生地黃二錢 水二鍾糯米一合竹葉十片煎一鍾食遠服

產實方 治產後大渴不止

蘆根切一升 瓜蔞 人參 甘草 茯苓各二兩 大棗二十枚 麥冬四兩

右以水九升煮取三升分三服頓服四劑即瘥忌菘菜

薰芩散 治產後血渴飲水不止

黃芩　麥門冬各等分

右㕮咀每服三錢水盞半煎八分去滓溫服

竹葉歸芪湯　治胃氣虛弱口乾作渴惡冷飲食者

竹葉一錢半　黃芪二錢　白朮人參當歸各一錢　麥門冬七分　甘草炙五分

右水煎服

玄胡索散　治產後失血渴不止

麝金　乾葛　桂心　青皮　枳殼　玄胡索

右等分以好醋浸一宿焙乾末之每服二錢陳皮

湯調下日三夜一

回津丸　産後虛渴去血多津液少腎氣虛引飲無度當養血通氣回津補氣則安

白芍藥　澤瀉　茯苓　川芎　各一錢　當歸　白朮　五味　各二錢　烏梅肉一錢

右爲細末煉蜜丸熱水吞下三十丸　一方加甘草二錢　訶子錢

自汗盜汗類

産後虛汗不止者由陰氣虛而陽氣加之熏虛表

實陽氣獨發於外故汗出也血爲陰產則傷血是爲陰氣虛而陽加於陰故令汗出陰陽虛弱不復則汗出不止多產後多汗遇風變成瘛瘲不成痓亦虛之短氣身體柴瘦口乾燥久則經水斷絕由津液竭也

全生活血湯　治發熱自汗盜汗日晞晞四肢無力口乾頭暈行步欹側

升麻　芍藥炒各三錢　柴胡　當歸　防風　羌活　獨活　葛根　甘草炒各二錢　川芎

藁本各一錢半　生地熟地各一錢　細辛
蔓荊子各五分　紅花三分

右每服五錢水煎熱服

麻黃根散　治產後虛汗不止

當歸　黃芪　麻黃　牡礪煅爲粉各等分　人參

右吹咀每服四錢水一盞煎七分去滓溫服

經効方　治產後汗出不止

黃芪十二分　白朮　牡礪煅　茯苓　防風

麥冬去心 生地黃各八分 大棗七枚

右㕮咀水二升煮取七合去滓空心分溫兩服

止汗散 治產後盜汗不止一應汗多者皆可服

牡蠣煅研 小麥麩炒令黃色 猿爲粉

右等分和勻煮生猪肉汁調下二錢無時服

人參湯 治產後諸虛不足發熱盜汗

人參 當歸各等分

右爲末以猪腰子一隻去脂膜切小片子以水三升糯米半合葱白二條煮米熟取清汁一盞入藥

二錢煎至八分温服

當歸六黃湯　治氣血虛熱益汗不止心血不足加

酸棗仁炒

當歸　熟地　黃芪炒各二錢　生地　黃柏炒黑

黃芩炒黑　黃連炒黑各一錢

右水煎服

往來寒熱類

產後血氣虛損陰陽不和敗血不散能令作寒作

熱陰勝則寒陽勝則熱陰陽相乘或寒或熱若因

產勞傷臟腑血弱不得宣越故令敗血不散入於肺則熱入於胛則寒若誤作瘧治之則謬矣

加減烏金散　治產後寒熱似瘧

厚朴　柴胡　黃芩　麻黃各二錢　陳皮　當歸　川芎　桔梗　茯苓各一錢半　桂枝　蒼术　白芷　枳殼各一錢　羌活　草果　半夏各二錢　甘草九分　白芍藥　熟地黃各一錢半

右剉爲散分作兩服每服用水一鍾半生姜三片　葱三莖煎一鍾服　有汗加當歸　川芎　白芍

熟地　有脹倍厚朴　陳皮　有熱加柴胡
黃芩　有寒加蒼术　草果　桂枝　有痰多
半夏　桔梗　茯苓　有頭痛多川芎　白芷
羌活　有瀉去枳殼　甘草不用

增損柴胡湯　治產後虛發寒熱飲食少腹脹

柴胡　人參　甘草　半夏　陳皮　川芎
白芍藥　各等分

右每服三錢姜五片棗二枚水同煎食後日二服

熟地黃散　治產後蓐勞皆由體虛氣力未壯勞復

四肢煩疼時發寒熱不思飲食

熟地黃　人參　白芍藥　白茯苓　白朮
續斷各兩　黃芪　桂心　五味子　當歸
川芎各七錢半

右㕮咀每服四錢姜三片棗一枚水煎服

黃芪丸　治產後虛勞寒熱進退頭目炫痛骨節痠疼氣力羸乏

黃芪　鱉甲　當歸炒各一兩　桂心　白芍藥
續斷　川芎　牛膝　蓯蓉　沉香　柏子仁

枳殼各七錢半　五味子　熟地黃各半兩

共爲細末煉蜜丸如梧子大每服四五十丸食後粥飲下

瘧類

產後瘧疾多由汚血挾寒熱而作或因脾胃虛弱飲食停滯或外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏審証而治

草果飲子　治產後瘧疾寒熱相半者或多熱宜此

半夏湯泡　赤茯苓　甘草炙　草果炮去皮

川芎　陳皮　白芷各一錢　青皮去白　良姜
紫蘇各一錢半　乾葛四錢

右㕮咀每服三錢水一盞姜三片棗二枚同煎至七分去滓當發日侵晨連進三服無有不安

生熟飲子　治產後虛多寒者

肉豆蔻　草果仁　厚朴　半夏　陳皮
茸草　大棗去核　生姜

右八味等分細剉和勻一半生一半用濃綿帛裹煨令香熟去昏與一半生者和勻每服五錢用水

二盞煎至七分食前一服食後一服

七寶飲　久而不已者用此截之方見胎前瘧

蓐勞虛羸類

產後蓐勞者此由生產日淺血氣弱飲食尚未平復日月未滿氣血虛羸將養失所風冷客之風冷搏於氣血則不能溫於肌膚使人虛乏勞倦顏容憔悴食飲不消風邪感於肺肺受微寒故咳嗽口乾遂覺頭昏百節疼痛榮衛風邪流注臟腑盜汗顏發寒熱如瘧背膊煩悶四肢不舉沉重着床此

則蓐勞之候也

石子湯　療產後虛羸喘乏乍寒乍熱如瘧四肢疼痛面色痿黃名曰蓐勞一

猪石子一雙去膜脂四破　香豉一方無此有知母　葱白切

粳米　當歸　芍藥各二兩

右㕮咀分兩劑每劑用水三升煮取一小碗去滓分三服

猪腰子粥　治蓐勞發熱

用猪腰子一枚去白膜切作柳葉片以塩酒拌先

用粳米一合入葱椒煮粥鹽醋和將腰子鋪盌底以熱粥蓋之如作盒生狀空心服

人參鱉甲散　治虛勞血氣虛損勞動成瘧其狀虛羸乍起乍卧飲食不消時有咳嗽頭目昏痛發歇無常夜有盜汗寒熱如瘧背膊拘急沉困在床服此大効

人參　桂心　當歸　柴胡　生　白茯苓　白芍藥　桃仁　麥門冬　熟地黃　甘草各半兩　續斷二錢半　牛膝七錢半　鱉甲

黃芪各
兩

右爲細末每服先以猪腰一對去筋膜以水兩大盞生姜半錢棗三枚煎至一盞去猪腎姜棗然後入藥末二錢葱白三寸烏梅一個荆芥五穗煎至七分去滓空心晚食前温服此藥神効

壯丹散　治產後虛羸發熱自汗欲變辱勞或血氣所搏經候不調或寒熱羸瘦

白芍藥　當歸　五加皮　地骨皮

人參各半
兩

沒藥　桂心各二
錢

壯丹皮三
錢

右為細末每服二錢水酒各半盞開元錢一枚麻油蘸之同煎七分去渣通口服煎不得攪吃不得吹

黃芪煮飲　產後勞傷肌膚黃瘦面無顏色或惡寒壯熱四肢痠痛心煩頭痛

鱉甲醋煮　黃芪各二兩　桂心　當歸炒

菜穿生　白茯苓　白芍藥　人參　燒地

麥門冬　甘草炙各半兩　牛膝七錢半

右為細末每服用豬石子一對去脂膜切破先以

水一盞入姜半錢棗三枚煎至七分去石子姜棗
却下藥五錢更煎至四分去滓空心晚食前温服

二滓併煎

十全大補湯　治諸臟虧損氣血俱虛惡寒發熱或
自汗盜汗便血吐血或大便不實飲食少思或胸
腹作痛口舌生瘡或耳目不明牙齒不固

人參　白朮　白茯苓　黃芪　當歸
熟地酒洗蒸　白芍藥炒　川芎各一錢　肉桂
半兩炙各五分

右㕮咀水煎服

黃芪建中湯　治產後諸虛不足發熱或惡寒腹痛

黃芪炒　肉桂各一兩　白芍藥炒二兩　甘草炙半錢

每服五錢姜棗水煎服日二三服虛甚加附子

當歸羊肉湯　治產後雖無疾但覺虛弱兼心腹痛

肥羊肉一斤去脂水一斗煮取八升去肉　當歸五兩　黃芪四兩

生姜六兩

右以肉汁煮三味取二升五合分爲四服若覺惡露不盡加桂三兩惡露下多加芎三兩有寒加茱

萸一兩有氣加細辛二兩有熱加生地黃汁二合

痞悶類

產後榮衛大虛血氣未定食麵太早胃不能消化麵毒結聚於胃脘上薰胸中是以口乾燥渴心下痞悶醫者不識認爲胸膈壅滯以藥下之萬不得已但服此藥

見睍丸

姜黃炒　三稜醋炒　蓽澄茄　陳皮去白　良姜

人參　蓬莪茂酒炒等分

右爲細末用蘿蔔搗爛絞取汁煮麵糊爲丸如梧子大每服三十丸蘿蔔湯下白湯亦可

生地黃湯　產後煩悶虛熱血傷風邪乘之氣乃不宣而痞塞生熱煩疼口乾悶多好飲水

生地黃　清酒五升　生姜汁三合　當歸一兩爲末

童子小便一升

右和煎三四沸分四服藥消進食食消進藥

腹脹類

產後腹脹滿悶嘔吐不定此因敗血散於脾胃脾

受則不能運化精微而成腹脹胃受之則不能受納水穀而生吐逆若與尋常治脹止吐藥治更傷動正氣但服

抵聖湯入生姜半兩焙乾水煎　方見胎前腹脹

局方　平胃散　加人參亦可

水腫類

產後四肢浮腫者敗血乘虛停積循經流入四肢留淫日久却還不得腐爛如水故令面黃四肢浮腫醫人不識便作水氣治之凡治水多用導水藥

極虛人產後旣虛又以藥虛之是謂重虛往往多致夭柱但調經散血行腫消則愈

小調經散

沒藥　琥珀　桂心　芍藥　當歸各一錢

細辛　麝香各半錢

右爲細末每服半錢姜汁溫酒各少許調停服

乾漆散　治產後遍身青腫疼痛及產後血水疾

乾漆　大麥蘗等分

右各爲細末以新瓦罐子中鋪一重麥蘗一重乾

添加此填滿用塩泥固濟火煅通赤放冷研爲散
但是産後諸疾熱酒調下二錢
枳朮湯　治心腹堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分
白朮三兩　枳實一兩半
右㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服
腹中爽即當散也
奪魂散　治産後虛腫喘促利小便則愈
生姜三兩取汁　白麪三兩　大半夏七枚

右以生姜汁拌麵裹半夏爲七餅子煨熟爲末水調一盞小便利爲効

張氏方　治産後血虛風腫水腫

澤蘭葉　防己　等分

右爲末每服二錢温酒調下不飲者醋湯調亦可

加味八物湯　治産後遍身浮腫氣急潮熱

人參　白茯苓　熟地黄　小茴香　各二錢

白朮　川芎　各四錢　當歸　白芍藥

香附子　各五錢　甘草　黄芩　柴胡　各一錢

右剉散分作六七服每服水一盞半姜三片煎至七分空心熱服盡此藥方服調經九若胸痛加延胡索乾漆枳殼各三錢若嘔吐惡心加良姜砂仁各二錢若手足麻痺加肉桂一錢半若咳嗽加五味子款冬花杏仁

積聚類

夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成皆由飲食不節寒熱不調產後血氣傷於臟腑臟腑虛弱爲風冷所乘與血氣相結故成積聚積塊

芍藥湯　治産後諸疾不可攻宜養陰去熱其病自安

芍藥一斤　黄芩　茯苓各六兩

右剉散每以半兩水煎溫服日三

丹溪心法　産後消血塊

滑石三錢　没藥　血竭各二錢

右爲細末醋糊丸如惡露不下以五靈脂爲細末麪糊丸白朮湯陳皮湯任下

又方　消血塊

香附童便浸 桃仁去皮尖留 等分

右爲細末醋糊丸

產寶方 療血瘕痛無定處

童便三升 生地黃汁 生藕汁 各一升 生姜汁三升

右先煎前三味約三分減二次下姜汁慢火煎如稀飴每服取一合暖酒調下

四神散 治產後瘀血不消積聚作塊心腹痛

川芎 當歸 乾姜 赤芍藥 各等分

右爲細末每服二錢食遠用温酒調服

桂心丸　治産後血氣不散積聚成塊上攻心腹或成寒熱四肢羸瘦煩疼

桂心　當歸　赤芍藥　牡丹皮　炙藥　檳榔各半兩　青皮　乾漆炒烟盡各七錢半　大黄　桃仁去皮尖三稜煨　玄胡索　鱉甲酥炙厚朴製各一兩

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服三四十丸食前温酒送下

霍亂類

產後霍亂氣血俱傷臟腑虛損或飲食不消腸胃風冷陰陽不和穢濁相干氣亂於腸胃之間真邪相搏冷熱不調上吐下瀉故曰霍亂也

立定散　治產後霍亂吐利頻渴手足厥冷

白朮　橘紅　麥門冬去心　乾姜　人參各一兩　甘草半兩

爲粗末每服四錢水一盞生姜五片煎去滓溫服

溫中散　治產後霍亂吐瀉不止

人參　白朮　當歸　草豆寇仁　乾姜各一兩
厚朴製兩半

右爲粗末每服三錢水煎服

附子散　療產後霍亂不止手足厥冷

附子炮　白朮　當歸　吳茱萸洗　桂心
人參　丁香　橘紅　甘草各半兩

右爲細末每服二錢粥飲調下

龍肝散　吐逆不受湯藥

次伏龍肝細末三錢米湯調下即受

嘔吐類

夫胃爲水穀之海水穀之精以爲血氣榮潤臟腑因產傷動臟腑有時氣乘腸胃腸胃燥澁其氣逆故嘔逆不下食也

開胃散　治產後胃氣不和嘔吐不止全不納食宜服此藥

訶子肉一兩　人參一兩　甘草半兩

右三味爲細末別以半夏半分生姜一分薤白二七莖水一大盞煎至六分去滓分爲兩服

立効方　療産後嘔逆不止

橘皮一兩　半夏麴　甘草各半兩　藿香二兩

右爲細末每服二錢水一盞半姜三片煎六分溫服

石蓮散　治産後咳逆嘔吐心怔目暈

石蓮子去殼一兩半　白茯苓一兩　丁香五錢

右爲細末米飲調三錢無時服

又方　内熱嘔吐服前藥不効

枇杷葉去毛蜜炙　茅根各五錢

煎濃湯入蘆根汁半盞和勻服

吃逆類

肺主氣五臟六腑俱稟於氣產後氣血臟腑俱傷而風冷搏於氣氣則逆上胛虛聚冷胃中伏寒因食熱物冷熱氣相衝擊使氣逆而不順則吃逆也

丁香散　治產後心煩咳噫不止

丁香　白豆蔻仁各半兩　伏龍肝一兩

右爲細末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢如人行五里再服

石蓮散　見嘔吐

產寶方　療產後吃逆三日不止欲死方

桂心半兩　薑汁三合

右同煎取三合以大火炙手摩背熱時參藥汁盡妙

羌活散　治吃逆

羌活　附子炮　懷香炒各半兩　木香

白薑炮各二錢半

右五味爲末每服二錢水一盞鹽一捻煎十數沸

熱服一服即止

又方　治產後吃逆

用乾柿一個切碎以水一盞煎六分熱呷之

咳嗽類

肺主氣產後血虛肺經一感微邪便成咳嗽或風或熱或寒或濕皆令咳嗽也若產後吃鹽太早而咳嗽者難治

旋覆花湯　治產後傷風寒喘咳嗽痰涎壅盛坐臥不寧

旋覆花　赤芍藥　荆芥穗　半夏麴　前胡
甘草炙　茯苓　五味子　杏仁去皮尖
麻黄各等分

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜三片棗一枚煎至七分去滓食前温服有汗者去麻黄

知母飲。治産後惡露上攻流入於肺經咳嗽宜服此藥若傷風痰嗽邦以尋常傷風藥主治

知母、貝母　白茯苓、人參各二錢　桃仁杏仁並生去皮尖各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

經効方 療咳嗽多痰噦粘氣急

前胡 五味子 紫苑 貝母各一兩 桑白皮 茯苓各二兩 淡竹葉二十片

右㕮咀水二升煎至八合去滓食後分二服

百合散 療產後咳嗽氣急

百部根 苦梗各六分 桑白皮二十分 乾百合 赤茯苓各八分

右㕮咀水二升煎取七合去滓食後分兩服

喘類

產後所下過多榮血暴竭衛氣無主獨聚肺中故令嗽也此名孤陽絕陰爲難治若惡露不快敗血停凝上薰於肺亦令喘急但服奪命丹症去喘自定

血竭散　治產後敗血衝心胸滿上喘命在須臾宜服

真血竭如無紫碾代　沒藥

右等分研細每服二錢用童便合好酒半大盞煎

一沸温調下方產下一服上床良久再服其惡血自循經下更不衝上免生百病

參蘇飲　治產後血入於肺面黑發喘欲死者

人參一兩為末　蘇木二兩

右以水兩碗煮取蘇木一碗以下去渣調參末隨時加減服神効

旋覆花湯　見前咳嗽

若傷鹹冷飲食而喘者宜見晛丸　見前痞悶類

大補湯　治產後百日外面青浮腫唇口氣急有汗

乃大虛之症急用服此

當歸頭　大川芎　大白朮　白芍藥

白茯苓各　人參各　黃芪各　五味子

熟地黃　乾薑　甘草少

右劑散水煎服如痰不退加川烏末各等分磨入服

有瀉加訶子肉豆蔻粟殼

五味子湯　治產後喘促脈伏而厥

五味子炒　人參　杏仁各二錢　麥門冬去心

陳皮各一兩

右姜三片棗二枚水煎服

血崩類

產卧傷耗經脉未得平復勞役損動致血暴崩淋瀝不止或因酸鹹不節傷蠹榮衛衰弱亦變崩中若小腹滿痛肝經已壞爲難治急服固經丸以止之

固經丸

艾葉　赤石脂煅　補骨脂炒　木賊各半兩

附子一枚炮

右爲末陳米飯和丸如梧子大每服二十丸食前
温酒下米飲亦得

瑞蓮散　治産後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮百枚燒存性　棕櫚燒存性　當歸　桂心各一兩
鯉魚鱗燒　川芎各七錢　檳榔二枚

右爲細末每服三錢煖姜酒調下如未止更進一
服或非時血崩無藥可治但進三服即止

白芍藥散　治産後崩中下血淋漓不絕黃瘦虛損

白芍藥　牡蠣　乾薑　熟地黃　桂心

黃芪血骨　鹿角膠　龍骨各一錢　烏賊血骨

右爲末每服二錢食前溫酒下

阿膠丸　治產後崩中下血不止虛羸無力

阿膠　赤石脂各一兩半　續斷　川芎　當歸

甘草　丹參各一兩　龍骨　鹿茸酥炙　諸魚骨

烏賊血骨　鱉甲炙各二兩　共爲細末

右煉蜜爲丸梧桐子大空心溫酒一日二三十丸

菖蒲酒　治產後崩中下血不止

菖蒲一兩半細剉

以酒二盞煮取一盞去滓分三服食前

月水不調類

產後月水不調者由產傷動血氣虛損風邪冷熱之氣客於經絡乍冷乍熱冷則血結熱則血消故血或多或少或在月前或在月後故名不調也

琥珀調經散　治產後經脉不調四肢煩疼飲食全少日漸羸瘦

琥珀　牛膝　生乾地黃　當歸各一兩　桃仁　赤芍藥各半兩

右爲細末每服三錢水一盞姜三片煎六分去滓
服

姜黃丸　治產後虛乏不足心胸短氣腹內緊急腰
背疼痛月水不調食少煩渴四肢無力

薑黃　當歸　熟地黃　牡丹皮　厚朴製
桂心　川芎　續斷　桃仁　白朮各一
兩
赤芍藥　木香各七
錢半　羚羊角屑二錢
半

右爲細末煉蜜如梧桐子大每服三十丸食前服
溫酒下

瀉痢類

產後腹痛瀉未有不皆曰產後脇門虛怯寒邪易侵若未滿月飲冷當風乘虛襲留於肓膜散於腹脇故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化洞泄腸鳴或下赤白胠脇塡脹或痛走不定急服調中湯立愈若醫爲積滯取之禍不旋踵

調中湯

高良薑　當歸　桂心　芍藥　附子炮　川芎各兩　甘草半兩

右爲粗末每服三錢七水三盞煎一盞去滓熱服

茯苓湯　治產後泄

茯苓　川芎　黃芩　白朮　乾薑　滑石　陳皮　芍藥炒各等分

右水煎服之

人參白朮散　治產後泄瀉

人參　白朮　茯苓　甘草　陳皮　半夏　製朴　砂仁　當歸　神曲炒

姜三片水煎服

歸芎散　治產後身熱腹痛泄瀉

當歸　川芎　白芍藥　玄胡索　砂仁

甘草　白朮　神曲　茯苓　乾姜皮

水姜煎服

赤白痢疾類

產後痢疾者由產勞傷臟腑不足勞動大早誤食生冷風冷乘虛誤入腸胃生冷難化之物傷於脾胃皆令洞泄水瀉甚者變爲痢也若血滲入大腸則爲血痢難治世謂之產乳痢也得冷則白或如

魚腦得熱則赤黃或爲驟血若冷熱相搏則下赤白痢或膿血相雜若下痢青色則極冷也若飲食不進日夜無度產後本虛又痢不止必至危篤當愼治之

急救散　治產後赤白痢腹中絞痛

芍藥　阿膠　艾葉　熟地黃各一兩　甘草　當歸各三兩

右㕮咀水煎分二服空心飲

黃連丸　治產後赤白痢腹中攪痛不可忍

黃連四兩　阿膠　蒲黃　梔子仁各一兩

當歸二兩半　黃芩　黃柏各二兩

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服六七十丸米飲吞下日三夜一

白頭翁散　治產後下痢虛極者

白頭翁　阿膠各二兩　黃連　黃柏

秦皮各三兩　甘草二兩

右以水七升煮取二升半納膠令消分三服

神馬飲　治產後血痢小便不通臍腹疼痛

用生馬齒莧搗汁二大合煎一沸下蜜一合調頓服

又方　産後痢日五十行者

取木棗蛀虫棄屑炒黃急以水沃之令稍稀得所服之即瘥

經効方　治産後久痢津液涸渴不止

龍骨十二分　厚朴　茯苓　黃芪　麥門冬各八分　生姜六分　大棗十四個並細剉

右以水一大升煮取七合空心分兩服

當歸飲　產後痢疾

當歸　川芎　芍藥炒　香附炒　陳皮

茯苓　甘草　砂仁　澤瀉　白朮　神曲炒

乾姜炒　木香不見火爲末餘藥煎熟入末服

右水煎服

神龜散　治產後胎前痢疾

敗龜甲一枚米醋炙研爲末醋湯調下

又方　婦人臨產痢疾

山梔不拘多少燒灰爲末空心溫服熱水調下

錢甚者不過五服

大便秘澁類

產卧水血俱下腸胃虛竭津液不足是以大便秘澁不通也若過五六日腹中悶脹者此乃燥糞在臟腑以其乾澁未能出耳宜服麻仁丸以滋潤之誤爲有熱投之寒藥則腸消陰長變証百出性命危矣

麻仁丸

麻仁研如泥 枳殼 人參各一兩 大黃半兩

右爲末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下二十丸未遍漸加丸數不可太過

四物青皮湯

當歸　川芎　生地　芍藥　青皮去白

水煎服甚効

神應散　產後秘結不通膨滿者氣急坐臥俱難用

大麥蘗炒黃爲末酒下一合神効

大小便不通類

產後大小便不通者腸胃本挾於熱因產血水俱

下津液燥竭腸胃痞澁熱氣結於腸胃故令大小便不通也

桃仁散　治膀胱氣滯血澁大小便秘

桃仁　葵子　滑石　檳榔各等分

右爲細末每服二錢空心葱白湯調下

車前散　治産後大小便不利下血

車前子　黃芩　滿黃　牡礪　生地黃

芍藥各一兩五錢

右爲細末空心米飲服方寸匕忌麵蒜

乳飲　治產後大小便不通諸藥不應者令飲牛乳人乳尤善一日稍通三日而痊

淋閉類

產後諸淋因產有熱氣客於胜中內虛邪起數熱則小便澁痛故謂之淋有因產損氣虛則挾熱熱則搏於血即流滲於胞中故血隨小便出而爲血淋淋者淋瀝之謂也

茅根湯　治產後諸淋無問冷熱膏石氣結悉主之

白茅根八兩　瞿麥穗　白茯苓各四兩　葵子

人參各二兩　蒲黃　桃膠　滑石　甘草各一兩

紫貝十枚煅　石首魚頭中石二十枚燒

右剉散每服四大錢水一盞半姜三片灯心二十莖煎至七分去滓温服亦可爲末木通煎湯調下二錢如氣壅閉木通橘皮煎湯調下

滑石散　療產後淋

滑石一兩二兩麪半炒　通草　車前子　葵子各一兩

右爲末以漿水調服方寸匕至二七爲妙

張不愚方　療產後小便不通淋悶

陳皮一兩去白爲末

空心温酒調下二錢一服便通

魚齒散　治産後淋小便痛及血淋

白茅根五兩　瞿麥　車前子各一兩

鯉魚齒一百枚爲末　通草三兩　冬葵子二合

右水二升煮取一升入魚齒末空心服

灸法　産後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒蓋緣未産之時因積冷氣遂致産時尿胞運動不順用塩於産婦臍中填與臍平用葱白剥去粗皮十

餘根作一縛切作一指厚安鹽上用大艾炷滿葱并子大小以火灸之覺熱氣直入腹中即時便通神驗

小便類

產後小便數者乃氣虛不能制或因穩婆不慎以致胞損而小便淋瀝或因膀胱氣虛而小便頻數或膀胱陰虛而小便淋瀝隨經補治之

桑螵蛸散　治產後小便數及遺尿

桑螵蛸三十枚煨　鹿茸酥炙　黃芪各三兩　牡礪煨

人參　厚朴　赤石脂各二兩

右爲末空心粥飲調下二錢

括蔞湯　療產後小便數兼渴

桑螵蛸　甘草並炙　黃連　生姜各二兩

括蔞根三兩　人參三兩　大棗五十枚

右細切用水七升煮二升半分三服忌猪肉冷水

又方　治產後小便數及遺尿

益智仁爲末米飲調下

小便不禁類

婦人產蓐產理不順致傷膀胱遺尿無禁或因收生不謹損破尿膀致患此疾

止遺方　產後尿不禁面微浮畧發熱于午後此膀胱爲坐婆所傷

黃芪　歸身尾　芍藥各一錢半　白朮一錢　人參　陳皮各五分　甘草炙少許

右水煎熱服之

廣濟方　治產後小便不禁

鷄尾毛燒存性酒調下一七日三服

千金方　治產後遺尿不知出

白薇　芍藥各等分

右爲末酒服方寸匕日三

固脬散　治婦人臨產時傷手脬破小便不禁

黃絲絹白然黃者染色不用三尺以炭灰汁煮極爛以清水洗去灰令淨入黃蠟半兩

密一兩茅根二錢

馬尻勃末二錢

右用水二升再煎至一盞空心頓服服時飲氣服之不得作聲作聲無驗

補脬飲　治產後傷動脬破終日不小便但淋濕不

乾

生絲絹黃色者一尺　白牡丹皮根木　白茯各一錢

用水一碗煎至絹爛如餳服之勿作聲作聲無効

鷄內金散　治產後溺床失禁

以鷄胜胵一具并腸洗燒爲末酒調服方寸匕

小便出血類

產後小便出血者因氣虛而熱乘之血得熱則流散滲於胞內故血薄小便出

血餘散　治小便利血

亂髮湯洗垢膩淨

右燒研爲末米飲調服方寸匕

又方

用滑石研髮灰等分每服一錢地黃汁調下

雀氏方　療産後血滲入大小腸

蜜一大合　車前子搗汁一升

右相和煎沸分兩服

補遺方　治産後小便出血

川牛膝去蘆　水煎服

又方

生地黃汁半升　生姜自然汁半合

右相和服之

陰脫產門不閉類

婦人趨產勞力努氣太過致陰下脫若脫肛狀及陰下挺出逼迫腫痛舉重勞皆能發作清水續續小便淋露

硫黃散　治產後勞傷陰脫

硫黃　烏賊魚骨各半兩　五味子三錢半

右爲末摻患處

桃仁膏　治產後陰脹妨悶

桃仁去皮尖　枯礬　五倍子各等分

右以下二味爲末研桃仁爲膏拌勻傅之

硫黃湯　治產勞玉門開而不閉

硫黃四兩　吳茱萸　兎系子各一兩半　蛇床子一兩

右每服四錢水一碗煎數沸濾滓洗玉門日再洗

熨法

單炒蛇床子乘熱布裹熨患處亦治產後陰痛

歸芩散　治陰下脫

當歸　黃芩各二兩　芍藥一兩半　蝟皮燒存性半兩

牡蠣煅二兩半

共爲末每服二錢溫酒米湯任意調下忌登高舉重

又方　產後子宮不閉

補中益氣湯加白芍醋附半夏酒芩熱不退加酒柏

外治方　治產後陰腫下脫內出玉門不閉

石灰一升炒極熱湯二升投灰中適温冷澄清坐水中
以浸玉門斯須平復如故

又方　療産後陰下脫

燒兎頭末傳之

又方

以鉄精粉上推内之

補遺方　治産後生瘡不收

用枳殼煎湯坐浸良久即入

又方

草麻子十四粒去殼搗爛塗頂心如收即洗去

又方

五倍子白礬煎湯浸洗良

乳少類

婦人乳汁或行或不行者皆由氣血虛弱經絡不調所致也乳汁勿令投於地蟲蟻食之令乳無汁大抵婦人素有疾在衝任經者乳汁少而色帶黃所生之子怯弱而多疾

漏蘆散　療乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡凝滯

妳乳脹痛猫聲邪毒或作癰腫此藥服之自然内消乳汁通行

漏蘆二兩半　蛇蜕十條炙　瓜蔞十個燒焦存性

右爲末温酒調下二錢服藥後即以猪蹄羹投之

又方

葵菜子炒香　縮砂仁各等分

右爲細末每服二錢熱酒調下滋益氣脉榮衛行津液極有驗

産寶方　療産後乳無汁

土瓜根　漏蘆各三兩　甘草二兩　通草四兩

右水八升煎取二升分溫三服忌如常法

湧泉散　療產乳無汁亦治乳結癰腫

穿山甲洗淨一兩灰炒燥

右爲細末酒調服方寸匕

鍾乳散　療乳婦氣少血衰脉澁不行乳汁絕少

成煉鍾乳粉研細　濃煎漏蘆湯調下二錢

靈苑立効方

粳米　糯米各半合　萵苣子一合並淘淨

生甘草半兩

用水二升煎汁去滓三八直下

羅氏湧泉散　治婦人乳汁因氣絕少

瞿麥穗　麥門冬去心　龍骨　穿山甲炮黃

王不留行各等分

右爲細末每服一錢熱酒調下後吃猪蹄羹少許

吹妳類

產後吹妳者因兒吃妳之次兒忽自睡呼氣不通乳不時洩蓄積在內遂成腫硬壅閉乳道津液不

通傷結疼痛亦有不痒不痛腫硬如石名曰吹奈若不急治腫甚成癰產後吹奈少若緩治結癰致死時或有之速用皂角散括蔞散傳以天南星散以手搽之則散矣

括蔞散

乳香一錢研 括蔞實一個

研勻温酒煎服

天南星散

南星爲末温湯調以鵝翎蘸塗患處

皂角散

歌曰　婦人吹妳治何如皂角燒灰蛤粉和熱酒一盃調八字須臾揉散咲呵呵

又方　治妳結腫硬痛

用百藥煎爲細末每服三錢酒一盞煎數沸熱服

青葉散

青嫩葉葉研細米飲調攤帋上貼之

妬乳類

妬乳者由新產後兒未能飲之及乳不洩或乳脹

捏其汁不盡皆令乳汁蓄結與血氣相搏即壯熱大渴引飲牢強掣痛手不得近是也初覺即以手將捏去汁更令傍人助吮引之不爾或作瘡有膿熱甚必生癰也輕則爲吹乳妒乳重則爲癰雖有專門不可不知

連翹湯　治產後妒乳并癰

連翹　升麻　芒硝　玄參　芍藥　白斂　防風　射干　大黃　杏仁　甘草各一錢

右作一服水二鍾煎一鍾食後服

瓜蔞飲　治產後婦乳初結脹不消令敗乳自退

瓜蔞一個半生半炒　大粉草一寸半生半炙　生姜一塊半生半煨

右同剉用酒一碗煮取一盞去滓服之甚痛一會不可忍即搜去敗乳臨卧再一服順所患處乳側卧於床上令其藥行故也

神應散　治吹乳作癰

葵莖及子　擣篩爲散酒服方寸匕即愈

又方　療乳腫將吹結成癰

右以馬溺塗之立愈

赤龍皮湯　凡婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黃汁出浸淫爲長百種療不差者動經年月名爲妬乳

槲皮三升切　以水一斗煮取五升夏冷用秋冬溫之分以洗乳

天麻湯　天麻草五升切　以水一斗半煎取一斗隨寒溫分洗乳以殺痒也洗畢敷膏散

飛烏膏散　用燒硃砂作水銀上黑烟三兩熬令焦燥

礬石三兩燒粉

右二味以絹篩細以甲煎和之令如脂以傳乳瘡
日三作

又方　治乳頭破裂痛

苧麻根搗傳之愈

又方　取秋後冷落茄子花裂開者陰乾燒存性水
調塗之

補遺經驗異症治類

婦人無子非藥可療者二若年命相尅墳墓不利
是也病夫病婦疾勞傷氣血并俟不調將理失宜

飲食不節乘風取涼冷氣乘虛結於子臟決難有
孕自少有疾多服熱藥天癸早耗終身無子女人
血弱子臟冷滯久不生育丈夫勞傷風虛日暗精
氣不濃精清如水精冷如氷不能施化皆宜服藥
產育正治之外更有異症非經圖所載者今廣諸
見聞以備症療治
灸法　女人無子及已經生子久不再孕懷娠不成
者
右以女人右手中指節文一寸灸指向上量之用

草一條是七寸尉足仰卧以所量草自臍心直垂下至草盡處以筆點之此不是穴以原草平摺横安前點處其草兩頭是穴按之有動脉各灸三壯如筋杪大極有神効

勝金丸 和血温經 治婦人久虛無子及產前後一切病患兼治男子下虛無力此藥能安胎催生妊胎臨月服五七丸產時滅痛婦人無子是子宮冷如服二十九男女自至又治積年血風脚手痲痺半身不遂赤白帶下血如山崩及治產後腹中結痛吐

逆心痛手死腹中繞臍痛氣滿煩悶失盖汗不出
月水不通四肢浮腫無力血勞虛勞小便不禁中
風不語口噤產後痢疾消渴眼前見鬼迷暈敗血
上衝寒熱頭痛面色痿黃沈瀝諸疾血下無度血
痢不止飲食無味產後虛羸虛煩勞悶產後血癖
產後羸瘦凡婦人累年不問年深日近並宜服之
一名金不換治婦諸虛不足心腹疼痛
菜本　當歸　石脂赤白皆可　白芍藥　人參
白薇　川芎不見火　牡丹皮　桂心　白芷

白朮米泔浸　白茯苓　玄胡各一兩　甘草炙

山藥各五錢

右爲細末煉蜜丸如彈子大每服一丸温酒化下初産了用熱醋湯下食前服此方凡婦人懷身便服此藥甚有神効常服尤妙

温中龍骨散澀脫燥濕　治婦人腹下十二經絶産一曰白帶二曰赤帶三曰經水不利四曰陰胎五曰子藏堅[illegible]七曰陰陽患痛八曰内強九曰腹寒十曰藏閉十一曰五藏酸痛十二曰夢與鬼交

並宜服之

龍骨三兩　半夏　黃蘗　竈中黃土　桂心

乾姜各二兩　石蓂　滑石各一兩　烏賊魚骨

代赭各四兩　白殭蠶五枚

右治下篩酒服方寸匕日三白多者加烏賊骨殭蠶各二兩赤多者加代赭五兩小腹冷加黃柏二兩子藏堅加乾薑官桂各二兩以上多隨病增之服藥三月有子即住藥太過多生兩子當審方取好藥寡婦童女不可妄服

小白薇丸 和劑 治婦人衝任虛損子藏受寒久無子息及斷續不產此由上熱下冷百病滋生或月水崩下帶漏五色腰腹疼重面黃肌瘦或因產乳不能將護路厠太早或久坐濕地或冷風從下入血藏既虛風邪內乘或月水當行失於調攝傷動胞絡陰陽不和上焦虛陽壅燥下藏邪冷結伏致使胎孕不成冷極傷敗月水不勻飲食減少夜多盜汗面上黯黮齒搖髮落腳膝痛重舉動少力並宜服之

覆盆子去梗　菖蒲微炒　遠志去心　桃仁去皮尖麩炒黃

白茯苓去皮　藁本去苗　卷栢去根　肉桂去粗皮

人參各三兩　白龍骨　川椒去目并合口者炒出汗

白薇去苗各一兩　乾薑炮　細辛去苗　蛇床子炒

當歸去蘆　車前子　芎藭各半兩　熟地黃

麥門冬去心各一兩半

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒或米飲送下此藥常服壯筋骨益血氣煖子宮除風冷令人有子

烏鷄煎丸和劑　治婦人胎前産後諸般疾患並皆治之此藥温經之劑氣血攻補備焉

烏雄鷄一隻　烏藥　石牀　牡丹皮　人參　白朮　黄芪各一兩　蒼朮米泔浸切焙一兩半　海桐皮　肉桂去粗皮　附子炮去皮臍　白芍藥　蓬莪朮　川烏炮　紅花　陳皮各二兩　玄胡索　肉豆蔻　木香　琥珀　熟地黄洗焙　草果各半兩

右細剉用烏雄鷄一隻湯褪去毛及腸肚將上件藥安放鷄肚中用新磁瓶以好酒一斗同

煮令乾去鷄骨以油單盛焙乾爲細末煉蜜和丸
如梧桐子大每服三十丸
胎前產後傷寒蜜糖酒下　胎前氣悶壯熱炒姜
酒下　赤白帶生薑地黃酒下　產後敗血注心
童子小便炒薑酒下　產後血塊塡築心腹疼痛
玄胡索酒下　胎前嘔逆薑湯下　催生炒蜀葵
子酒下　安胎鹽酒下　室女經脉當通不通四
肢疼痛煎紅花酒下　血氣攻刺心腹疼痛煎當
歸酒下　血暈椶櫚燒灰酒調下　血邪研硃砂

麝香酒下　血悶煎烏梅湯研硃砂下　子宮欠冷温酒或束湯下空心日一服　血風劳人參酒吞下　小腹疙痛炒茴香鹽酒吞下　血散四肢遍身虛浮黃腫赤小豆酒下　常服温酒醋湯任下並空心食前服

濟陰丹　理氣活血消瘀　治婦人血海虛冷久無子息及產後敗血冲心中風口噤子死腹中擘開口灌藥須臾生下便得無恙治墮胎腹中攻刺痛橫生逆產胞衣不下血暈血癖血崩血滯血入四肢一應血

臟有患及諸種風氣或傷風吐逆咳嗽寒熱往來遍身生瘡頭痛惡心經脉不調赤白帶下乳生惡氣胎臟虛冷數曾墮胎崩赤不定因此成疾室女經脉不通並宜服之當曰煖子宮和血氣悅顏色退風冷能消除百病

三稜二兩　蓬朮一兩切片煨　蒼朮泔浸去皮　枳殼去穰

大艾去梗　劉寄奴　香附子淨　敗薑各一兩半

烏豆三合已上九味以穀醋三升煮乾取出焙乾　當歸身酒蒸

橘皮去白細紅者佳　白芍藥各一兩半　蒲黃隔紙炒

牡丹皮去骨　官桂去粗皮　赤芍藥　片薑黃

青皮去白各一兩　生地黃酒浸　熟地黃酒浸

川芎各七錢半　玄胡索炒　五靈脂酒煮

白朮煨各半兩

右爲細末以糯米粉穀醋打糊爲丸如梧桐子大

每服五十丸空心沉香湯送下蘇湯塩湯下亦可

莪朮散 抑氣養血受妊之源　隨証酌量加入

莪朮煨　川芎　當歸　熟地黃酒蒸洗

白芷　茴香　楊芍藥　甘草各一兩

右爲細末每服五錢鹽酒調下

月水不調勻銀器加灯心　安胎加黃芪生地黃

補虛調氣加生姜紅棗　遍身虛腫加當歸酒

小便不通加滑石末　心虛加硃砂研末調　敗

血冲心腹疼如刀刺燒秤錘紅淬酒如不退五靈

脂酒洗秤遍身疼炒姜酒　吐酸水加丁香七粒

煎湯甚力也空攻眼目浮腫加荊芥　小腹痛加

木瓜艾上惟浮腫用姜湯或葱湯　胃虛惡心加

藿香　冷嗽加桑白皮乾柿　頭痛加川芎細辛

血風潮熱加生薑紅棗　虛汗加麻黃根　吐不止加青陳皮　血風腰痛加芡薑子搥碎　女人血結不通手發攣急不知其數薺菜一握順流水柳汁下　手足痺痛柳根浸酒　女人血氣成塊築心銀子灯心　血崩赤白帶貞龍骨末好紅酒調　血風中心狂言亂語渾身壯熱加桃柳枝七寸　血刺成塊不散蒸酒　女人癖氣膈氣炒茴香酒　婦人不問虛熱傷風潮熱增寒一切百病先以三服隨証湯引投之服以他藥調理甚應

冷嗽豬血　心燥豬肝酒　催生順流水滑石禹
餘糧榆白皮坯子乳香葵子酸車草汁煎湯黃柞
葉垂下者　胎衣不下再加茂朮地黃竹青　行
血菴蕳生地黃紅花蘇木陳艾減楊芍藥加赤芍
藥　婦人病去經調自成妊娠
溫白丸　治婦人病去繼續而生帶下淋瀝五邪失
心憂愁思慮意思不樂飲食無味月水不調及腹
中一切疾病有似懷孕連年累月羸瘦因弊或歌
或哭或如鬼所使以上諸証皆令無子服此藥効

桔梗　柴胡　菖蒲　吳茱萸湯泡七次焙乾

紫菀去苗土　黃連去毛　肉桂去粗皮　厚朴去粗皮姜汁炙

人參　茯苓　皂角去皮子炙　蜀椒去目并含口者炒出汗

巴豆去皮心膜出油炒細研各半兩　川烏炮去皮臍二兩半

右爲細末研勻煉蜜丸梧子大每服三丸漸加至五七丸食後臨卧薑湯送下

琥珀澤蘭煎和劑　治婦人三十六種血氣八風五痺七癥八瘕心腹刺痛中風癱瘓手足痠疼乳中結瘀妊娠胎動胎死不出產衣不下敗血湊心頭庭

眼花血疰四肢渾身浮腫衝任久虛絕產無嗣早晚服食或因有子經脉不調赤白帶下惡心嘔逆身體瘦倦懷入月一日一服滑胎易產

琥珀　澤蘭葉　牡丹皮去心　紫巴戟去心糯米炒

茴香　五味子去梗　五加皮　劉寄奴草去枝

白芷　川當歸酒浸　赤芍藥　金釵石斛去根酒浸

川芎　白芍藥　生地黃洗焙　熟地黃洗焙

人參　白朮　附子　艾葉醋炒糯米糊調成餅焙乾爲末各一兩

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食前用

溫酒磨化服　漏胎刺痛煮糯米飲下　寒熱往來四肢煩痛煎當歸湯下　婦人室女經閉前紅花酒下　血暈不省人事煎童子小便和煖酒下　催生鷄子清和酒下　血氣血塊攻刺心腹煞秤錘淬酒下　傷寒及中風口噤煎麻黃湯下以被蓋出汗即愈　心驚悸及頭痛薄荷酒下　咳嗽煎柴白湯下　血氣攻痛渾身瘙痒頭面麻痺炒黑豆浸酒下　產後產前常服不生諸疾甚効

瘕証　孕婦不語非病也問有如此者不須服藥臨

產月但服保生丸四物湯之類產下便語得亦自然之理非藥之功也醫家不說與人臨月則與孕婦常之藥產後能語則以為醫之功豈其功也哉

黃帝問曰人有重身九月而瘖此為何也岐伯對曰胞之絡脈絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰無治也當十月復

治婦人生下孩兒但不能發聲謂之喑生世俗多不知救深為可憫今後有此切不可斷臍將胞衣用

火炙令瘕氣入兒腹內却取猫一隻用青布袋裹其頭兒使一伶俐婦人拏住猫頭向兒耳邊以口着力咬破猫耳猫忽大叫一聲兒即省開口發聲遂得生矣

又法兒因難產或逆產下不哭微有氣者即以本父毋真氣度之亦活皆經驗方也

胤產全書卷四終