衛生家寶產科備要

衛生家寶產科方目錄

卷一

產圖

入月安產圖

體聖祖御名子借地法

禁草法

禁水法

產前將護法

產後將護法

逐月安産藏衣并十三神行遊法
催生符　符貼式
保生圓　當歸圓
當歸建中湯

卷二

孫真人養胎論
徐之才逐月養胎方
烏雌雞湯　補胎湯
艾葉湯　黃連湯

雄雞湯　茯神湯
菊花湯　調中湯
阿膠湯　安中湯
麥門冬湯　柴胡湯
葱白湯　杏仁湯
芍藥湯　葵子湯
半夏湯　豬石湯
丹參膏　甘草散
千金圓　蒸大黃圓

滑胎令易產方
卷三
論初姙娠
竹茹湯　人參散
地黃圓　阿膠散
保安散　神妙千金圓
論欲產并產後
琥珀散　催生通靈散
七寶散　牡丹飲子

單方黑神散　芍藥湯
寇痛散　四順理中圓
玉露散

卷四

二十一論并增入十八論　郭稽中附方
黑神散　蒲黃黑神散
奪命丹　勝金散
清魂散　見現圓
增損四物湯　調經散

七珍散　調中湯
赴痛散　麻仁圓
黑神圓　固經圓
巨勝湯　大巖蜜湯
小續命湯　濟危上丹
論臨月將息
論新生小兒 并小兒方肆道
注唇膏　豆蔻散
蝎梢散　治齁喘

累用經効方
大聖澤蘭散　奪命褐散子
地榆降血飲子　大安胎飲子
吴白术散　滑胎榆白皮方
催生并死胎方　難産方
橫生逆生方四道
妊娠煩悶胎熱方
妊娠傷墜胎動方
胎動口噤唇青方

胎動下血心腹脹方
產後血暈方四道
產後中風方
產後發狂方
產前傷寒方

卷五

產科雜方
催生如聖散　救生散
單胎散　二聖散

羌活散　黃金散
薑粉散　香連散
地黃散　香脂散
血竭散

十八論中治產前產後諸疾黑神散功效

續添產前產後十八論烏金散功效

宣經圓　烏金散

產前所忌藥物

卷六

虞氏備產濟用方
妊娠　入月
臨產　產後
產後諸證用藥例
難產逆產橫產　胎衣不下
妊娠食忌　入月借地法
十二月產卧藏衣吉凶圖
產前諸方

川芎散　枳殼湯
蟹爪湯　又方
又方　人參圓
保生圓　五積散
又方　順元散
催生神効聖功散
催生安胎救命散
神効催生丹　催生如聖圓
產後諸方

勝金湯　又方
又方　漬小便方
燒鹽法　百草霜散
又方　黑散子
烏金散　金黃散
麒麟竭散　千金散
地黃散　牡礪散
桃仁散　川芎散
金花散　當歸散

人參散　四神散
香桂散　當歸散
柿湯　荊芥散
陳梅散
難產方十二道
逆產方八道
橫產方六道
胎衣不下方七道
治產前產後痢疾方

許學士產科方

滑胎枳殼散　內補圓

木香圓　白朮散

紫蘇飲　下死胎方

琥珀散　佛手散

愈風散　交加散

蒲黃散　護胎方

又方　麻仁蘇子粥

鹿屑湯　治婦人死胎不下方

卷七

胎孕方

人參白朮散

千金半夏茯苓湯

枳殼散　陳逍遥水酒散

檳榔散　治胎不穩方

治娠孕墜傷胎動方

治胎動已死未死方

千金解蟹爪湯　又方

葱白湯　白朮散

治妊娠傷寒大熱胎不安方

治妊娠傷寒大熱令胎不落方

治妊娠小便卒不通方

又方

產前方

榆皮滑胎散　黑神散

催生桂散

治難產或橫倒胎死方

治難產胎衣不下方
又方
易產方
下死胎方
治草蓐或產後血暈五絕中風方
產後方
牛膝湯
聖功川芎湯
當歸建中湯
琥珀黑神散
又方
小琥珀散
下鬼胎方

通宣圓　八味黑神散
烏金散　劉寄奴飲
當歸一味散　荆芥一味散
秤槌酒　豆淋紫酒
產婦忽患寒熱方
治產後傷寒惡露不行方
傷寒產後惡露爲熱搏不行
宜服抵當湯桃仁承氣湯
桂心牡礪湯　增損柴胡湯

人參散

治產後惡露不絕方

治產後洞泄惡物方

治產後下痢赤白膿血方

產後傷食宜服食藥感應圓

治吹妳腫硬方

治吹妳或兒絕妳後乳腫疼方

萬金散

通用四物湯

追命散

卷八

形初保育

小兒初生將護法　乳兒法

擇乳母法　哺兒法

乳母雜忌法　拭兒口法

浴兒法　灸臍法

斷臍法　甘草法

裹臍法　豬乳法

黃連法

藏衣法　剃頭法

襁謝法　初生不作聲

初生不喫奶　初生吐不止

初生有蹙癬病

初生有重舌

葛氏肘後治卒重舌方

初生着噤

翰林醫學差充南康軍駐泊張永校勘

衛生家寶產科方目録

衛生家寶產科備要卷第一

產圖

入月安產圖

凡產於入月一日貼在卧閣內正北壁上

凡安產藏衣方位並於卧閣內分布

凡逐月安產藏衣避忌神煞方位並隨節氣更換候交得次月節即換次月產圖

凡產訖棄廢穢汚不淨之水並隨藏衣之方所向不拘遠近棄之切忌向閉肚之方也

體聖祖御名子借地法

東借十步　西借十步

南借十步　北借十步

上借十步　下借十步

壁方之中四十餘步安產借地恐有穢汚或有東海神王或有西海神王

或有南海神王或有北海神王或有
日遊將軍白虎夫人遠去十丈軒轅
招搖舉高十丈天符地軸入地十丈
令此地空閑產婦某氏安居無所妨
礙無所畏忌諸神擁護百邪遠去急
急如律令勅

禁草法鋪草及氈褥訖即呪曰

鐵鐵湯湯非公所當是王言得之
銅一言得之鐵母子相生俱箴鐵急

急如律令

禁水法欲施時貯水呪曰

南無三寶水　水在井中爲井水

水在河中爲河水　水在器中爲淨水

水在法中爲真水　自知非真莫當真水

以淨持濁　以正治邪

日遊月殺　五士將軍

青龍白虎　朱雀玄武

招搖天狗　軒轅女妖

天吞地吞　　鬾尸閉肚
六甲禁諱　　十二神王
土符伏神　　各安所在
不得動靜　　不得忌干
若有動靜　　若有忌干
施以神呪　　當攝汝形
阿佉尼阿毗羅莫多梨婆地梨沙訶

產前將護法

按諸家產論云凡婦人姙娠入月不

可沐頭濕冷流于足太陽之經多令
子横逆不順誡之誡之又切忌飲酒
恐産時心神昏亂臨産之時不可令
傍人喧擾大小倉忙慮致驚動産母
秖可令熟事産婆及穩婆謹卓老成
親盛三兩人扶侍産母初覺腹痛且
宜任意坐卧勉強飲食恐致臨産氣
力虛羸若腹痛漸甚唯且熟忍仍可
按節次漸服滑胎榆白皮散壹貳服

服藥之法切勿太早須得其時又傍人不得逼迫且須令人扶策徐徐而行若行步稍難即凭物而立須臾扶策再行直至腹痛連腰相引作陣痛頻時即服催生丹壹服更且勉強扶行陣痛轉甚難以行立認是產時將至即服催生符畢然後安詳上草上草之時切勿傷早若太早則子在腹中難以轉側又須子細體候直待兒

逼欲生然後令抱腰也抱腰之人不得傾斜則兒得順其理自然易產也又有卧產者亦待卧定背平着蓆體不偃曲則子不失其道苟或不能依此節適必致產難縱或幸免必須憂生諸疾

產後將護法

按經云婦人非止臨產須憂至於產後大須將護勿以產時無他乃縱心

恣意無所不犯犯時微若秋毫感病重於嵩岱且才得分免切忌問是男是女看血下多少隨證服壓血運藥良久喫粥服四順理中圓 方見第二卷末 便令人從心下按至臍腹日伍柒次若有疾證即隨證服藥粥藥相間頻頻服餌且閉目而坐背後倚物左右看承常令直立兩膝雖時眠睡頻令喚覺過一伏時方得上床亦須立膝高

楮床頭厚鋪裀褥遮圍四向窒塞孔隙以禦賊風一臈之內常聞醋煙以防運悶一臈之後漸加滋味或以羊肉及雌鷄煑取濃汁作糜粥直至百晬常服當歸圓當歸建中湯四順理中圓日各壹兩服以養藏氣補血脉兩臈之後方得食糜爛肉食滿月之內尤忌任意飲食觸冒風寒恣情喜怒梳頭用力高聲作勞工巧之類及

上厠便溺如此節養將攝以至百晬始得氣血和調腑臟平復設不依此即致產後餘疾

逐月安產藏衣并十三神行遊法

東

[illegible]

雷公招搖

軒轅大時

咸池吳時

豐天狗隆

北

甲寅乙卯

己酉庚申辛未壬午癸巳

丙安產吉
午狂虎

丁未

戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑

甲寅乙卯丙辰丁巳

東

南

西



北
南
巳
丙
午
丁
未
申
庚
酉
辛
戌
亥
壬
子
癸
丑
寅
甲
卯
乙
辰
坎
二
離
天侯
天狗
吳時
豐隆

東
南
午
離
三
炁
丙
藏衣吉
天狗
巳
癸
四
炁
丑
艮
子
白鬼狂亂
壬
安靜吉人
辛
戌
乾
六
炁
亥
坎
一
炁
壬
癸
北

北

丑癸子壬亥

自虎陰 昊昨

天人

月天候

南

巳招搖 雷公

丙

午 軒轅 大時

丁

未咸池 天狗

申酉

水瓶 水魚

戌

酉 四 南

辛

戌 公 癸

申

亥 多 陽

庚

亥 陰 陽

甲

子 乙 卯

寅

東

卯 木 瓣

乙

辰

www.kongfz.com

北

癸丑人未入

子安宅安葬吉

庚申辛酉日死人家属

甲乙卯日死人家属

東

大葬時大吉

戊己日葬吉

庚申辛酉日死人家属

丙午丁未日死人家属

天狗落

西

南

藏衣吉

招摇狂虎

北

丑癸子壬亥 寅艮卯乙辰

戌 大軒 駱駝 沈

南

巳丙午丁未 申坤酉辛戌 乾亥壬

天候 招搖 豐隆 吳時 雨師 雲漢 女媧 伏羲 太陰 太陽 北極 天一 太乙 攝提 軒轅 咸池 天狗 天弧 弧矢 南極 老人 河鼓 牽牛 織女 天津 鉤陳 天市 王良 傅說 閣道 五車 參 伐 觜觿 天苑 昴 畢 天園 天苑 天囷 大陵 五諸侯 天船 積水 積薪 井 鬼 天狼 南河 東井 輿鬼 柳 七星 張 翼 軫

北

壬癸子壬亥
注虎座吉

庚 坎 癸
酉 七 亥
辛 离 甲
申 午 寅

未 丁 午 丙 巳 乙 辰 甲 卯

南

北

丑 癸 子 壬 亥 乾 天 狗

艮 八 坎 白 震 陰 昌 曜

寅 癸 八 離 午 軒 轅 時

甲 卯 乙 辰 巽 巳 雷 公 白 虎

南

未 丁 申 坤 酉 辛 庚 地 咸 池

母 地 四 綠 存 輔 左

大 金 匱 法 用 乙 加 甲 遁 局

六 癸 貴 人 逆 行 之 訣

北

大人宜靜

公吉 火時 黃 朱雀 勾陳 青龍 天后 太陰 玄武 白虎 太常 天空 天德 月德 月空 月合 月德合 天德合 月刑 月害 月破 大耗 伏兵 官符 歲破 龍德 白虎 福星 天喜 天醫 天馬 解神 天貴 天權 天祿 天刑 朱雀 天賊 天獄 天牢 天哭 天虛 弔客 病符 喪門 貫索 五鬼 勾絞 天狗 天厄 地破 地空 地劫 災煞 天煞 地煞 月煞 亡神 劍鋒 小耗 勝光 小吉 傳送 從魁 河魁 登明 神后 大吉 功曹 太衝 天罡 太乙

己夫人 丙安產吉 午白虎狂虎 南 丁未

北

癸丑 子壬亥 招搖 值之 天狗

戊 大軒轅 值 池

庚申 十 帝 午丙巳 天候

酉 夫人

辛 女 癸

未丁 吳時 豐隆

白虎

南

四神相應之地

四面皆水之處 魚鼈多之

北

丑癸子壬亥

招搖在亥

癸壬子癸丑

癸亥壬子癸

北方壬癸水

天德

東

甲寅乙卯辰

天德藏於名

巳丙午丁未

藏衣吉

南

未丁午丙巳

夫人

申庚酉辛戌

大將軍

戌辛酉庚申

西

北

甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥
十二辰
子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥
雷公 軒轅時 大成池
天雅 玉女 丑 子 登 明 魁 罡 臨 陰 貴 人

南

催生符



右件符用水飛朱砂書之

符貼上寫者式



催生治產難靈符每遇產婦將欲上草時燈焰上燒灰不得飛揚了急投盞中用淨水温調服須臾即產

保生圓養胎益血安和子臟治妊娠將理失宜或因勞役胎動不安腰腹痛重

胞阻漏胎惡露時下子臟挾疾久不成胎或受娠不能固養瘦燥不長過年不產日月雖滿轉動無力或致損墮及臨產節適乖宜驚動太早產時未至惡露先下胎胞枯燥致令產難或橫或逆痛極悶亂連日不產子死腹中腹上冰冷口唇青黑吐出冷沫新產惡血上衝運悶不省喘促汗出及瘀血未盡臍腹疠痛寒熱往來或因產勞損虛羸未復面

黃體瘦心忪盜汗飲食不進漸成蓐勞
入月常服壯氣養胎正順產理潤胎易
產產後常服滋養血氣和調陰陽盜腠
理實腑臟治風虛除痼冷

甘草 炙微赤剉　貝母 剉
乾薑 炮剉　秦椒 去目及閉口者微炒出汗
桂 去麤皮不見火　黃芩 剉尖如鍾者
石斛 去根　石膏 細研如粉
粳米

大豆黃卷各壹分

當歸半兩去蘆頭酒浸壹宿劉碎微炒

麻子仁壹兩半

右拾貳味爲末煉蜜爲圓如彈子大每服壹圓温酒或棗湯化下嚼亦得空心食前

當歸圓治產後虛羸及傷血過多虛竭少氣臍腹俱急痛引腰背面白脫色嗜卧不眠唇口乾燥心忪煩倦手足寒熱頭重目眩可思飲食或勞傷衝任内

積風冷崩中漏下淋瀝不斷及月水將行腰腿重疼臍腹急痛及治男子婦人從高墜下內有瘀血吐血下血等病

當歸去蘆頭酒浸壹宿剉碎微炒

芎藭洗剉

續斷洗去根

乾薑炮

阿膠剉碎蛤粉炒令泡起篩去蛤粉用

甘草微炙剉

各肆兩白朮切焙

白芷去梢剉

附子炮裂去皮臍

各叁兩

桂去粗皮剉不見火

白芍藥各貳兩

熟乾地黃拾兩 酒浸壹宿浪乾劉焙
真蒲黃叁兩半 隔紙微炒
吳茱萸叁兩 湯浸柒遍控乾微炒
右壹拾肆味搗羅爲末煉蜜爲圓如梧桐子大每服貳拾圓食前以温酒下漸加至伍拾圓

當歸建中湯治婦人一切血氣虛損及產後勞傷虛羸不足腹中疗痛吸吸少氣小腹虛急痛引腰背時自汗出不

思飲食

當歸肆兩去蘆頭酒浸壹宿切焙

桂叁兩去麤皮劉

白芍藥陸兩劉

甘草貳兩炙劉

右爲麤散每服叁錢水壹盞半入生薑伍片棗壹枚擘破同煎至壹盞濾去滓熱服空心食前產訖直至滿月每日叁服令人丁壯

如頭痛眼目疼量加川芎貳兩防風壹兩

衛生家寶產科備要卷第一

衛生家寶產科備要卷第二

孫真人養胎論

論曰舊說凡受胎三月逐物變化稟質未定故姙娠三月欲得觀犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子盛德大師觀禮樂鍾鼓俎豆軍旅陳設焚燒名香口誦詩書古今箴誡居處簡靜割不正不食席不正不坐彈琴瑟調心神和情性節嗜慾庶使清淨生子皆良長壽忠孝

仁義聰惠無疾斯蓋文王胎教者也

論曰兒在胎日月未滿陰陽未備腑藏骨節皆未成足故自初訖于將產飲食居處皆有禁忌

姙娠食羊肝令子多厄

姙娠食山羊肉令子多病

姙娠食驢馬肉延月

姙娠食騾肉產難

姙娠食兎肉犬肉令子無音聲并

缺唇

妊娠食雞子及乾鯉魚令子多瘡

妊娠食雞肉糯米令子多寸白蟲

妊娠食棋并鴨子令子倒出心寒

妊娠食雀肉并豆醬令子滿面多黑黯黑子

妊娠食雀肉飲酒令子心經情亂不畏羞恥

妊娠食鼈令子項短

姙娠食冰漿絶胎

姙娠勿向非常地大小便必半產殺人

徐之才逐月養胎方

姙娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食大麥無食腥辛是謂才正

姙娠一月足厥陰脉養不可針灸其經足厥陰內屬於肝肝主筋及血一月之時血行疙澁不爲力事寢必安靜無念慮畏姙娠一月陰陽新合爲胎寒多爲痛

熱多卒驚舉重腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服烏雌雞湯

烏雌雞湯

烏雌雞壹隻治如食法

茯苓去黑皮　阿膠剉碎　各貳兩

芍藥白者　白朮去蘆

人參去蘆　各叁兩　甘草炙剉

生薑洗去皮切　各壹兩　吴茱萸壹升揀去枝梗

麥門冬伍合湯泡去心臙焙乾

右拾味咬咀以水壹斗貳升煮雞取
汁陸升去雞下藥煎取叁升內酒叁
升并膠烊盡取叁升放温每服壹升
日三次服

若曾傷一月胎者當預服補胎湯

補胎湯

細辛壹兩高麗者去葉　生薑肆兩洗拍去皮切碎
烏梅壹升搥碎　防風貳兩去蘆
乾地黃洗瀝乾剉　白朮去蘆　各叁兩

大麥炒　吳茱萸揀淨各伍合

右㕮咀以水柒升煮取貳升半分叁服食前服寒多者倍細辛茱萸若熱多渴者去細辛茱萸加枯樓根貳兩若有所思去大麥加栢子仁叁合一方有人參壹兩

婦娠二月名始膏無食辛臊居必靜處男子勿勞百節皆痛是爲胎始結婦娠二月足少陽脉養不可針灸其經

足少陽內屬於膽主精二月之時兒精成於胞裏當謹護驚動也

姙娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎悴中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所下乍寒乍熱艾葉湯主之

艾葉湯

艾葉去梗　丹參洗

當歸洗去蘆須切片焙　麻黃不去節　各貳兩

人參去蘆頭切　阿膠[illegible]碎　各叁兩

甘草壹兩炙　生薑陸兩洗擦去皮切

大棗拾貳枚去核

右玖味㕮咀以酒叁升水壹㪷煑減半去滓內膠煎取叁升分叁服一方用烏雌雞壹隻宿肥者治如食法割頭取血內叁升酒中相和雞以水壹㪷貳升先煑取汁去雞內藥煎取叁升內血酒并膠煎取叁升分作叁服

若曾傷二月胎者當預服黃連湯

黃連湯

黃連去須 人參去蘆切 各壹兩
吳茱萸伍合揀淨 生薑參兩洗擦去皮切碎
生地黃伍兩一方用阿膠

右伍味㕮咀以酢漿柒升煮取參升
分肆服日參夜壹十日一作若頗覺
不安加烏梅壹升加烏梅者不用漿
只用水耳一方用當歸半兩

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀
見物而化欲生男者操弓矢欲生女者
弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良
端坐清虛是謂外象而内感者也
妊娠三月手心主脉養不可針灸其經
手心主内屬於心無悲哀思慮驚動
妊娠三月爲定形有寒大便青有熱小
便難不赤即黄卒驚恐憂愁嗔怒喜頓
仆動於經脉腹蒲繞臍苦痛或腰背卒

有所下雄雞湯

雄雞湯

雄雞壹隻治如食法　甘草炙劉
人參去蘆切片　茯苓雪白者去皮
阿膠劉碎各貳兩　黃芩尖如錐者
白朮去蘆各壹兩　麥門冬伍合湯浸去心煕焙乾
芍藥肆兩洗　大棗拾貳枚去核
生薑壹兩洗擦去皮

右拾壹味㕮咀以水壹斗伍升煮雞

減半出雞內藥煮取半內清酒叁升
并膠煎取叁升分叁服一日盡之當
温卧一方用當歸芎各貳兩不用黃
芩生薑

若曾傷三月胎者當預服茯神湯

茯神湯

茯神 去木　丹參 洗
龍骨 五色緊者各壹兩　阿膠 剉碎蛤粉炒泡起去粉用
當歸 洗去蘆須切焙　甘草 炙剉

人參去蘆頭各貳兩赤小豆貳拾壹粒
大棗貳拾壹枚去核
右玖味㕮咀以酢漿壹斗煮取叁升
分肆服先食服七日後服一劑腰痛
者加桑寄生貳兩深師有雞白貳兩麻子壹升
妊娠四月始受水精以成血脉食宜稻
粳羹宜魚鴈是謂盛血氣以通耳目而
行經絡
妊娠四月手少陽脉養不可針灸其經

手少陽內輸三焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食

妊娠四月有寒心下愠愠欲嘔胷膈滿不欲食有熱小便難數數如淋狀臍下苦急卒風寒頸項強痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胷心煩不得安卒有所下菊花湯

菊花壹撮如雞子大　麥門冬壹升湯浸去心焙

麻黃不去節 阿膠剉碎 各叁兩
甘草炙剉 當歸洗去蘆須切焙 各貳兩
人參壹兩半去蘆頭切 生薑伍兩洗擦去皮切碎
半夏肆兩湯浸七次薑汁一宿 大棗拾貳枚去核

右拾味㕮咀以水捌升煮減半內清酒叁升并阿膠煎取叁升分叁服溫卧當汗以粉粉之護風寒四五日一方用烏雌雞壹隻煮水煎藥若曾傷四月胎者當預服調中湯

調中湯

續斷 去根洗焙乾　苦參 洗剉

甘草 炙 各壹兩　白朮 去蘆切焙

柴胡 去蘆洗　厚朴 削去皮生薑搗碎畧一宿次日焙乾

枳實 去瓤麩炒　生李根白皮 洗各叁兩

白芍藥 雪白者剉　生薑 洗云皮切　各肆兩

當歸壹兩半 洗去蘆須　烏梅壹升 搥碎

右拾貳味㕮咀以水壹斗煮取叁升分肆服日叁夜壹八日後復服一劑

姙娠五月始受火精以成其氣臥必晏起沐浴浣衣深其居處厚其衣裳朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和以菜萸調以五味是謂養氣以定五臟姙娠五月足太陰脉養不可針灸其經足太陰內輸於脾五月之時兒四肢皆成無大飢無甚飽無食乾燥無自灸熱無大勞倦

姙娠五月有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒

苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶頓欲仆卒有所下阿膠湯主之

阿膠湯

旋復花貳合去枝梗　阿膠肆兩剉碎
人參壹兩去蘆頭切　麥門冬壹升湯浸去心焙
生薑陸兩洗擦去皮切　吳茱萸柒合揀淨湯洗三次焙
黃芩尖如雞者　當歸洗去蘆須切片子焙
芍藥雪白者剉　甘草炙各貳兩

右拾味㕮咀以水玖升煮藥減半內清酒叁升并膠微火煎取叁升分肆服日叁夜壹先食服便愈不差再服一方用烏雌雞壹隻割取咽血內酒中以水煮雞以煎藥減半內酒并膠煎取叁升分肆服

曾傷五月胎者當預服安中湯

安中湯

黃芩壹兩（尖如錐者）當歸（洗去蘆須切片焙）

芎藭 洗剉
乾地黃 洗淨焙乾用 各貳兩
甘草 炙剉
芍藥 雪白者 各叁兩
生薑 陸兩 洗擦去皮切碎
麥門冬 壹升 湯泡去心焙
大麻仁 伍合 去殼
五味子 伍合 揀去枝梗
大棗 叁拾伍枚 去核
人參 去蘆頭切

右拾貳味㕮咀以水柒升清酒伍升
煮取叁升半分肆服日叁夜壹七日
復服壹劑

姙娠六月始受金精以成其筋身欲微勞無得靜處出遊於野數觀走犬及視走馬食宜鷙鳥猛獸之肉是謂變腠理紉筋以養其力以堅背膂

姙娠六月足陽明脉養不可針灸其經足陽明內屬於胃主其口目六月之時兒口目皆成調五味食甘美無大飽

姙娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體腫驚怖忽有所下腹痛如

欲產手足煩疼宜服麥門冬湯

麥門冬湯

麥門冬壹升湯浸去心　人參去蘆切片

甘草炙剉　黃芪各貳兩

乾地黃叁兩洗焙　阿膠肆兩生碎

生薑陸兩洗擦去皮　大棗拾伍枚去核

右捌味咬咀以水柒升煮減半內清酒貳升并膠煎取叁升分叁服中間進藥粥一方用烏雌雞壹隻煮水以

煎藥

若曾傷六月胎者當預服柴胡湯

柴胡湯

柴胡肆兩去蘆洗焙　芍藥雪白者一方作紫葳

白朮去蘆切焙乾　甘草炙　各貳兩

蓯蓉壹兩酒浸一宿切碎焙　麥門冬湯浸去心焙

芎藭洗　各貳兩乾地黃伍兩洗淨焙

生薑陸兩洗擦去皮切片　大棗叁拾枚去核

右拾味㕮咀以水壹㪷煑取叁升分

肆服日參夜壹中間進糜粥勿食生
冷及堅硬之物七日更服壹劑
姙娠七月始受木精以成其骨勞身搖
肢無使定止動作屈伸以運血氣居處
必燥飲食避寒常食稻粳以密腠理是
謂養骨而堅齒
姙娠七月手太陰脉養不可針灸其經
手太陰內屬於肺主皮毛七月之時兒
皮毛已成無大言無號哭無薄衣無洗

浴無寒飲

姙娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脉若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項及腰背強葱白湯主之

葱白湯

葱白拾肆莖長三四寸　麥門冬壹升湯浸去心焙

生薑捌兩洗擦去皮切片　甘草炙剉

當歸洗去蘆須切片子焙　黃耆搥褊蜜塗炙　各叁兩

人參壹兩半去蘆切片　阿膠肆兩剉碎

黃芩壹兩尖如錐者 旋復花壹合去枝梗
半夏壹升湯泡洗七次用生薑製一宿焙乾
右拾壹味㕮咀以水捌升煮減半內
清酒叁升及膠煎取肆升服壹升日
叁夜壹温卧當汗出若不出者加麻黃
去節貳兩煮服如前法若秋後勿強漬
汗一方以黃雌雞壹隻割咽取血內
酒中煮雞取汁以煎藥
若曾傷七月胎者當預服杏仁湯

杏仁湯

杏仁 湯浸去皮尖 甘草炙 各貳兩

麥門冬 湯浸去心焙 吳茱萸 揀淨湯洗三兩次焙各壹分

鍾乳 使煉成者粉尤勝生鍾乳 乾薑 炮烈 各貳兩

粳米伍合 紫菀壹兩 使茸

五味子叁合 去梗

右玖味㕮咀以水捌升煮取叁升半分肆服日叁夜壹中間進食七日服壹劑一方用白雞壹隻煮汁煎藥

姙娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極是謂盛腠理而光澤顏色姙娠八月手陽明脉養不可針灸其經手陽明內屬於大腸主九竅八月之時兒九竅皆成無食燥物無輒失食無忍大起

姙娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或黃或

使寒慄腰背苦冷而痛目䀮䀮芍藥湯主之

芍藥湯

芍藥白者剉　生薑洗淨去皮　各肆兩

甘草炙剉　當歸去蘆須洗切片子焙

白朮去蘆焙　人參去蘆切片　各叁兩

薤白壹升切洗　厚朴貳兩去皮生薑擣碎罨一宿焙

右捌味㕮咀以水伍升清酒肆升合煑取叁升分叁服日再夜壹一方用

烏雌雞煮汁以煎藥

若曾傷八月胎者當預服葵子湯

葵子湯

葵子貳升揀洗淨　生薑陸兩洗淨擦去皮切片

芍藥肆兩雪白者剉　白朮去蘆切焙乾

柴胡去蘆洗焙各叁兩大棗貳拾枚去核

甘草貳兩炙剉　厚朴貳兩去皮生薑搗碎炮一宿焙

右捌味㕮咀以水玖升煮取叁升分叁服日叁十日壹劑一方用烏雌雞

壹隻煮水以煎藥
姙娠九月始受石精以成皮毛六腑百
節莫不畢備飲醴食甘緩帶自持而待
之是謂養毛髮致力
姙娠九月足少陰脉養不可針灸其經
足少陰內屬於腎腎主續縷九月之時
兒脉續縷皆成無處濕泠無著灸衣
姙娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上
衝心腰背痛不可轉側短氣半夏湯

半夏湯

半夏湯泡七次以生薑貳兩煎一宿　麥門冬湯浸去心焙　各伍兩

當歸去蘆須洗切片子焙　吳茱萸揀淨湯泡洗三兩次焙　各

阿膠用蛤粉炒　各叁兩　乾薑壹兩炮烈

大棗拾貳枚去核

右柒味㕮咀以水玖升煮取叁升去滓內白蜜捌合微火上溫分肆服剂即止一方用烏雌雞壹隻煮汁煎藥若曾傷九月胎者當預服豬石湯

豬石湯

豬石壹具剝去筋膜洗淨　白朮肆兩去蘆切焙

茯苓去黑皮　桑寄生揀淨

乾薑炮烈　乾地黃洗淨焙

芎藭洗焙　各叁兩　麥門冬壹升湯浸去心焙

大豆叁合略炒　附子壹枚中者炮烈去皮臍切

右拾味㕮咀以水壹㪷煑石令熟去石內諸藥煎取叁升半分肆服日叁夜壹十日更壹劑

姙娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使關節人神皆備但俟時而生

姙娠一月始胚二月始膏三月始胞四月形體成五月能動六月筋骨立七月毛髮生八月臟腑具九月穀氣入胃十月諸神備日滿即產矣宜服滑胎藥入月即服

養胎臨月服令滑易產丹參膏

丹參膏

丹參半斤洗熟　芎藭洗焙

當歸洗去蘆須切焙　各貳兩

蜀椒伍合炒少時以椀合定出汗若有熱者以大麻人伍合代

右肆味㕮咀以清酒溲濕停一宿以成煎猪膏肆升微火煎膏色赤如血膏成新布絞去滓每日取如棗許內酒中服之不可過服至臨月乃可服

舊用常驗

甘草散令易生母無疾病未生一月日預服過三十日行步動作如故兒生墮地皆不自覺

甘草貳兩炙剉　大豆黃卷微炒

乾薑炮烈鏘碎　黃芩尖如錐者

桂心不見火剉　大麥蘖炒一方用粳米

吳茱萸揀去梗湯洗叁次焙　麻子仁各叁兩

右捌味爲細末每服貳錢酒調服日叁服白湯調亦得

千金圓主養胎及產難顛倒胞不出服壹圓傷毀不下產餘病汗不出煩滿不止氣逆滿以酒服壹圓良一名保生圓

甘草炙剉　貝母去心

秦椒炒出汗　乾薑炮烈鑱碎

桂心去皮不見火　黃芩尖如鏟者

石斛去根剉　石膏硬者不煨軟者火煅

粳米　大豆黃卷炒各陸錢

當歸拾貳錢洗去蘆須切片子焙

麻子叁合

右拾貳味爲末煉蜜和圓如彈子大每服壹圓日叁服用棗湯化下一方用蒲黃壹兩

薰大黃圓治姙娠養胎令易產

大黃叁拾銖薰剉　枳實剉去穰麩炒

芎藭洗剉焙　白朮去蘆切焙乾

杏仁湯泡去皮各拾捌銖　芍藥白者剉

厚朴削去皮生薑搗碎罨一宿　乾薑炮烈各拾貳銖

吳茱萸壹兩揀去梗湯泡洗三兩次焙
右玫味爲末煉蜜圓如梧桐子大空腹酒下貳拾圓日叁服未効加圓數

滑胎令易産方

車前子壹升水淘洗令淨控乾觸紙炒
阿膠捌兩剉碎蛤粉炒泡起去粉用
滑石叁兩
右叁味爲細末飲湯調服壹錢日再服如生月可服之藥利九竅未産不得先服