



中藥學第3 級

HM103 Herbology 3
(4 CREDITS)

第四类第四节

化止去温(温化寒痰)

麻仲学博士中药快速学习法

Dr. Ma Zhongxue's Chinese
Medicine Fast Learning
Method

第4類 化祛止溫藥

化痰藥
止咳平喘藥
祛痰藥(化痰药)
溫里藥

1. 溫化寒痰（祛寒痰）

代表藥物：天南星，白芥子，白附子，半夏，白前，橘紅

記憶歌訣：白芥白附天南星，
半夏皂莢寒痰用，
考加橘紅與白前。

天南星 (JACKIN THE PULPIT TUBER,
RHIZOMA ARISAEMATIS)

天南星，中藥名。為天南星科植物天南星的乾燥塊莖。





【毒性】無毒

【性味】味苦、辛，性溫

【歸經】歸肺、肝、脾經

**【功效】制天南星化痰散結，生天南星外用消腫
、蟲蛇咬傷**

師承劑量
Mentor Dose

【用量】
制天南星
3-9克
生天南星

外用生品適量，研末以醋或
酒調敷患處

【用药禁忌】

孕妇慎用；生品
内服宜慎。

白芥子(WHITE MUSTARD、SEMEN SINAPIS)

白芥子，別名辣菜子，一年或二年生植物白芥的乾燥成熟種子。



【毒性】無毒

【性味】味辛，溫

【歸經】歸肺、胃經

【功效】溫肺豁痰利氣，乳腺散結通絡止痛

師承劑量 Mentor Dose

【用量】3~9克

【用药禁忌】

**肺虚久咳及阴虚火旺者
禁服，皮肤过敏或溃破者忌用。**

白附子 (GIANT TYPHONIUM RHIZOME, RHIZOMA TYPHONII)

白附子，為天南星科植物獨角蓮



【毒性】無毒

【性味】味辛，性溫

【歸經】歸胃、肝經。

【功效】祛風痰，定驚搐，解毒散結，止痛


【用量】
3~9克

師承劑量
Mentor Dose



【用药禁忌】

阴血虚中风、内热惊风及孕妇禁服。



半夏，又名地文、守田、和姑等，屬天南星科。

**半夏 (PINELLIA、PINELLIA TERNATA (THUNB.)
BREIT)**

【毒性】有毒

【性味】味辛，性溫

【歸經】歸脾、胃、肺經

【功效】燥濕化痰，降逆止嘔，消痞散結

師承劑量

Mentor Dose

【用量】
3~9克

【用药禁忌】

**阴虚燥咳、津伤口渴、血证及燥痰者
禁服，孕妇慎服。**



皂莢 (CHINESE HONEYLOCUST FRUIT, GLEDITSIA SINENSIS LAM)

皂莢，蘇木科皂莢屬樹種之一。



【毒性】微毒

【性味】辛溫

【歸經】肺；大腸經

【功效】化痰散結，皂刺（皂角刺）拔毒

師承劑量 Mentor Dose

【用量】
3-15克


【用药禁忌】

体虚、孕妇及咯血、吐血患者忌服



考試加：白前

白前，为萝藦科植物柳叶白前 *Cynanchum stauntonii*(Decne.)Schltr.ex Lévl.或芫花叶白前 *Cynanchum glaucescens*(Decne.)Hand.-Mazz.的干燥根茎和根


- 
- 【毒性】無毒
 - 【性味】辛、苦，微温。
 - 【归经】肺经
 - 【功效】降气，消痰，止咳。

師承劑量 Mentor Dose

【用量】
3-10克

橘红, 为芸香科植物橘 *Citrus reticulata Blanco* 及其栽培变种的干燥外层果皮

考試加
: 橘紅



【毒性】無毒

【性味】辛、苦，温。

【归经】肺、脾。

【功效】理气宽中，燥湿化痰。

師承劑量 Mentor Dose

【用量】
3-10克

鉴别：陈皮与橘红

1、新旧不同：陈皮是成熟的橘皮经晒干或晾干制成的，一般放至隔年后才可以使用；橘红是新鲜的橘皮去掉内部白色部分后，再晒干而制成的。

2、功能不同：陈皮偏于入脾经，健脾和胃较好；橘红偏于入肺经，止咳化痰更佳。